

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
また、必要などきに読めるよう大切に保管してください。

フルコート®F 軟膏

第2類医薬品 湿疹・皮膚炎の治療薬 合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合 外皮用薬

本剤は皮膚疾患治療薬ですので、化粧用やひげそり後用として使用しないでください。大量又は長期にわたって使用すると顔面や口の周りにはきび・吹き出物ができたり、顔面の皮膚が赤くなったりむくんだり、皮膚が皸肌状になったり、多毛になることがありますので、特に顔面への使用には注意してください。また、症状改善後は漫然と連用しないでください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 抗生物質又は副腎皮質ホルモンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等のある患部。
(2) 湿潤、ただれのひどい患部。
(3) 目、目の周囲。
3. 顔面には広範囲に使用しないでください
4. 化粧用やひげそり後用として使用しないでください
5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 顔、口唇などの粘膜に使用する人。
(5) 患部が広範囲の人。
(6) 深い傷やひどいやけどの人。
(7) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(8) 高齢者。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、ただれ
皮膚(患部)	みずむし、たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能 ◎ 化膿を伴う次の諸症：湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、しもやけ、虫さされ、じんましん
◎ 化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎)

用法・用量 1日1～数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) おむつのあたる部分に使うときは、ぴったりしたおむつやビニール製等の密封性のあるパンツの使用はしないでください。
- (4) ラテックスゴム製品との接触は避けてください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (6) 本剤は外用にのみ使用してください。

成分(1g中)

成分	含量
フルオシノロンアセトニド (合成副腎皮質ホルモン)	0.25mg
フラジオマイシン硫酸塩 (抗生物質)	3.5mg(力価)

添加物：パラベン、ラウリン酸ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、サラシミツロウ、ワセリン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



製造販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区北浜2-6-18

ホームページ www.mt-pharma.co.jp

本品のお問合せは、お買い求めのお店、
又は下記にお願いいたします。
田辺三菱製薬株式会社「くすり相談センター」
(フリーダイヤル ☎0120-54-7080)
受付時間：弊社営業日の9:00～17:30

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

フルコート®F 軟膏

第2類医薬品 湿疹・皮膚炎の治療薬 合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合 外皮用薬

正しく知って、
正しく治す。

湿疹・皮膚炎などの皮膚トラブルは、皮膚で炎症が起こり、赤み、はれ、かゆみなどが症状としてあらわれます。かゆみの症状が強い時には、我慢できずについかいてしまいますが、かくことが刺激となってさらに炎症が強まり、また、かゆくなるという悪循環に陥ってしまいます。患部をかき壊してしまうと、治療期間が長引くだけでなく、治ってからあとが残ってしまいます。また、かき壊した傷口は細菌が増殖し化膿しやすい状態です。皮膚トラブルに気づいたら、すぐにしっかりと治療を行うことが大切です。



ステロイド剤について

ステロイド剤とは？

副腎皮質ホルモンは、体内で作られるホルモンのひとつで、からだの中で起こる炎症を抑えるはたらきがあります。その副腎皮質ホルモンの構造に改良を加え、抗炎症作用を強化したものが合成副腎皮質ホルモン剤、一般的にステロイド剤と呼ばれるものです。赤み、はれ、かゆみなどの症状を抑えるだけでなく、炎症が起こるのを抑えるはたらきがあります。

副作用について

ステロイドは内服薬として多くの炎症性疾患に使われてきましたが、副腎機能の抑制などの全身性副作用がしばしば問題になっていました。そのため、全身への影響が少なくなるよう開発されたのがステロイド外用剤です。ステロイド外用剤の副作用としては、長期連用した場合に皮膚が薄くなったり、皮膚の血管が拡張したりすることがあります。また、水虫などの感染を起こしている部位に使うと症状が悪化することがあります。この添付文書をよく読んで正しく使いましょう。



強さのランクについて

ステロイド外用剤の効果の強さは医療用医薬品を含めて5段階に分類されていますが、OTC医薬品としては「弱い」、「中くらい」、「強い」の3段階が市販されており、フルオシノロンアセトミドは「強い」に分類されます。



ステロイド剤の正しい使用方法

患部に適量[■]を1日1～数回塗ってください。湿疹やかゆみなどの症状がよくなってきたら、回数を減らしながら治るまで5～6日間を限度にお使いください。

※ 適量とは？

使用量の目安「フィンガーチップユニット」

チューブから、大人の人差し指の第一関節の長さくらい(約0.5g)を出した場合、大人の手ひら2枚くらいの広さに伸ばして塗ります。これを目安として、患部の広さと比較して使用量を決めます。



大人の手ひら2枚くらいの広さに伸ばします

- ❑ 患部以外や予防的には使わないでください。
- ❑ 使用する人の手ひら5枚以上の広範囲へは使用しないでください。
- ❑ 1週間を超える使用はしないでください。5～6日使用しても改善しない、あるいは悪化した場合は、他の原因、もしくは疾患の程度がセルフメディケーションの範囲を超えていることが考えられるので、医師又は薬剤師に相談してください。