

イブアウターゲル

鎮痛消炎薬

- イブアウターゲルは、EVEブランドの外用鎮痛消炎薬です。医療用医薬品として使用されている鎮痛成分ジクロフェナクナトリウムを配合。つらい肩こり痛や腰痛に優れた効果を発揮します。
- ジクロフェナクナトリウムが痛みのもと（プロスタグランジンの発生部位）まで浸透してダイレクトに効き、肩こり痛や腰痛などのつらい痛みを抑えます。
- のびが良いので肩や腰、関節部などにも使いやすい、ゲルタイプの軟膏です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

- ① 次の人は使用しないでください
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(4) 15才未満の小児。
- ② 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 皮ふの弱い部位（顔、頭、わきの下等）。
(3) 湿疹、かぶれ、傷口。
(4) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- ③ 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください
- ④ 長期連用しないでください



相談すること

- ① 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の医薬品の投与を受けている人。
ニューキノロン系抗菌剤
- ② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用后、次の症状があらわれた場合。



関係部位	症状
皮 ぶ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、皮ふのあれ、刺激感、色素沈着、水疱、落屑（皮ふ片の細かい脱落）

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
接触皮膚炎、 光線過敏症	塗擦部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がることもある。また日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがある。

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

用法・用量

1日3～4回、適量を患部に塗擦します。ただし、塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 1週間あたり、50gを超えて使用しないでください。
- (6) 同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。
- (7) 通気性の悪いもの（ラップフィルム、矯正ベルト等）で使用部位を覆い、密封状態にしないでください。
- (8) 使用後は手を洗ってください。
- (9) 厚く塗ったり、擦り込みすぎると、ゲルが白い塊状に変性する場合があります。

成分 1g中

ジクロフェナクナトリウム …………… 10mg

添加物として、アジピン酸ジイソプロピル、イソプロパノール、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、乳酸、ピロ亜硫酸Naを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (6) 衣服などに薬剤の色が付着することがあるので、塗擦後はよく乾かしてください。
- (7) アルコールなどで変質するおそれのあるもの（化学繊維、メガネ、塗装面など）には付着しないよう注意してください。
- (8) 使用期限をすぎたものは使用しないでください。

本剤のご使用により、変わった症状があらわれた場合は、エスエス製薬(株) お客様相談室までご連絡をお願いします。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社
〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
<http://www.ssp.co.jp/>