

トラベルミン®

チュロップ

ノンシュガー

ぶどう味

押し開けて

乗りもの酔いの
予防と緩和に

6錠(1錠×6包)

第2類医薬品

製造 高市製薬株式会社 発売元 エーザイ株式会社
 販売元 奈良県高市郡明日香村野口10 東京都文京区小石川4-6-10

本品に関するお問い合わせは、
 エーザイ
 「Thhcホットライン」へ
 ☎0120-161-454
 eisai.jp

使用期限 (西暦 年、月)
 製造番号

A3

第2類医薬品

販売名: トラベルミン チュロップぶどう味

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

⊗ [してはいけないこと] [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる]

● 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻次内服薬、アレルギー用薬等) ● 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

⊗ 相談すること

● 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 排原困難のある人 (6) 緑内障、心臓病の診断を受けた人 ● 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。[眩暈] 発疹・発赤、かゆみ [精神神経系] 頭痛 [泌尿器] 排原困難 [その他] 顔のほてり、異常なまぶしさ または次の重篤な症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。[再生不良性貧血] 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。[無顆粒球症] 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 ● 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 □ のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

■ 効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

■ 用法・用量

乗物酔いの予防には、乗車前30分前に、右表の1回量をかむか、口中で溶かして服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	4時間以上の間隔を置いて
11歳以上15歳未満	1錠	2回まで
5歳以上11歳未満	1錠	服用しないこと
5歳未満		

なお、追加服用する場合は、1回量を4時間以上の間隔を置いて服用してください。1日の服用回数は2回までとしてください。

[用法・用量に開連する注意] ● 小児(5歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。修学旅行などに持たせる場合には、事前に用法、用量など、服用方法をよく指導してください。【ご注意】● 本剤はかむか、口中で溶かして服用する薬剤です。かみにくい場合は、歯を傷めることのないように、溶かして服用してください。また、誤って喉につまらせないように、十分に注意してください。● 服用する時は1錠ずつとし、1度に2錠を口の中に入れてください。

■ 成分: 1回量 (11歳以上) 2錠中

d-クロロフェニラミンマレイン酸塩 …… 1.33mg
 スポロラミン臭化水素酸塩水和物 …… 0.166mg

添加物として、エタノール、クエン酸、プロピレングリコール、L-メントール、香料、アセスルファミンK、イソマル、グリセリン脂肪酸エステル、銅クロロフィリンNaを含有

■ 保管及び取扱い上の注意 ■

① 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。② 小児の手の届かない所に保管してください。③ 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。) ④ 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
 (独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigaL_camp/index.html
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

JAN バーコード