

ジシノコウ坐薬

（痔疾用外用薬）



使用上の注意

❌ 1. してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は使用しないこと

- （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （2）患部が化膿している人。

2. 長期連用しないこと



2. 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）授乳中の人。
- （4）高齢者。
- （5）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （6）次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量

本品1個(1.8g)中

リドカイン……………60.0mg
プレドニゾロン酢酸エステル………… 1.0mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩…………10.0mg
クロルヘキシジン塩酸塩………… 5.0mg
アラントイン……………20.0mg
添加物としてハードファットを含有します。

効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

（裏面もお読み下さい）


用法・用量


15歳以上：1回1個を肛門内に挿入してください。なお、1日3回まで使用できます。


〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後を使用すること。
また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後を使用すること。
- (2) 肛門にのみ使用すること。

【坐薬の取り出し方・挿入法】

- (1)  保護ケースを1区切りとり離して下さい。

保護ケースを1区切りとり離して下さい。
- (2)  左図のように坐薬の太い部分を上の方に向け、保護ケースの両面の端を軽く引き離して下さい。

左図のように坐薬の太い部分を上の方に向け、保護ケースの両面の端を軽く引き離して下さい。
- (3)  人差し指を坐薬の底にあて、先から肛門内に入るまで指で十分に押し込んで下さい。


人差し指を坐薬の底にあて、先から肛門内に入るまで指で十分に押し込んで下さい。

〔痔のなおりをはやめるために〕

- ・ 食事：便秘を整えるため、野菜・果物・海産物を十分に摂して下さい。
アルコールはよくありません。
- ・ 入浴：血行を良くすることにより、うっ血を取り去り、患部を清浄にしますので効果的です。
- ・ 排便：無理にいきまないようにし、排便後は肛門を清潔にしましょう。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(1～30℃)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 坐薬の先を下に向け、立てた状態で保管してください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



発売元

株式会社 南 薬 局

青森県青森市本町2丁目6-17
TEL 017-776-4177

製造販売元

明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地
TEL 03-3253-3451
(土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)