

タキザワの

漢方煎薬

第2類医薬品

5日分10包
503

排膿湯「タキザワ」



株式会社タキザワ漢方廠

漢方薬 排膿湯 「タキザワ」

△＜使用上の注意＞



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
- (1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人
むくみ
(6) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談してください。
- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこぼれる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。
4. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

【成分・分量】

カンゾウ..... 3.0g ショウキョウ..... 1.0g
キキョウ..... 3.0g タイソウ..... 6.0g

1日分(1包6.5g×2)13.0g

【効能・効果】

体力中等度以下で、患部が化膿するものの次の諸症：化膿性皮膚疾患・歯肉炎・扁桃炎の初期または軽いもの

【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煮つめ、和紙袋を除き、次の量を服用してください。

年 齢	1 回 量
成人(15歳以上)	全 量
15歳未満	服用しないこと

※用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 100160



製造販売元
株式会社 タキザワ漢方薬
さいたま市見沼区片柳412-1
お客様相談室 ☎048-688-7923
受付時間：9時～18時(月～金)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931