

タキザワの

漢方煎薬

第2類医薬品

5日分10包  
110

立効散「タキザワ」



株式会社タキザワ漢方廠

## 漢方薬 立効散「タキザワ」

15B

## △＜使用上の注意＞

## ❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。  
生後3ヵ月未満の乳児

## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師、歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 次の症状のある人  
むくみ
- (5) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【成分・分量】

サイシン.....2.0g カンゾウ.....1.5g  
シヨウマ.....2.0g リュウタン.....1.0g  
ポウフウ.....2.0g

1日分(1包4.25g×2) 8.5g

## 【効能・効果】

歯痛、抜歯後の疼痛

(効能・効果に関連する注意)

体力に関わらず、使用できます。

## 【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煮つめ、和紙袋を除き、次の量を口に含んでゆっくり服用してください。

年 齢	1回量
成人(15歳以上)	全量
15歳未満7歳以上	成人の2/3
7歳未満4歳以上	成人の1/2
4歳未満2歳以上	成人の1/3
2歳未満	成人の1/4

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は口に含んでゆっくり飲んでください。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 100146



製造販売元

株式会社 タキザワ漢方薬

さいたま市見沼区片柳412-1

お客様相談室 ☎048-688-7923

受付時間: 9時～18時(月～金)

タキザワ漢方

検索


ホームページ: takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎0120-149-931

アルミ袋  
個包装