

仏法僧印



第2類
医薬品

日本薬局方

カンゾウ末

販売名：高砂カンゾウ末

皮付

LOT. 内容量 500g

スプーン入 脱酸素剤入 (内袋の外) 

高砂薬業株式会社
 大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20
 お客様相談窓口 TEL 072-977-7151
 (9~17時、土・日・祝日を除く)



4 987574 140034

JAN 高砂カンゾウ末 500g 皮付

日本薬局方 **カンゾウ末**

販売名：高砂カンゾウ末

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

・短期間の服用にとどめ、連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 次の症状のある人——むくみ。
- (5) 次の診断を受けた人——高血圧・心臓病・腎臓病。

2. 服用後は、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この記載文面を持って医師の診療を受けてください。

症状の名称	偽アルドステロン症、ミオパチー
症 状	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この記載文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能又は効果】 激しい咳、咽喉痛の緩解

【用法及び用量】 成人(15歳以上)は 1回量 0.5 g、1日2回、食前または食間に服用する。

副作用被害救済制度の問合せ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
 ☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

版記号0811

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
4. 本品は、気密な袋に脱酸素剤を入れて保存性を高めてありますが、開封後は次の点に御注意ください。
 ・なるべくお早めに御使用ください。
 ・確実に封止して保管してください。
 (吸湿防止・虫や異物の混入防止)

◎尚、本品に異常がありましたら弊社まで御連絡ください。

H29

H30