

仏法僧印



第②類
医薬品

日本薬局方

センナ末

販売名：
高砂センナ末

LOT. 内容量 500g

スプーン入 脱酸素剤入
(内袋の外) 

高砂薬業株式会社
大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20
お客様相談窓口 TEL 072-977-7151
(9~17時、土・日・祝日を除く)



4 987574 1140096

JAN 高砂センナ末 500g

⊗【してはいけないこと】

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品は使用しないでください。
・他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 【用法及び用量】に示す量よりも過剰に服用しないでください。



【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人 --- はげしい腹痛、吐き気・嘔吐。
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 |
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 --- 下痢。
 4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

高砂センナ末 H26



使用上の注意

日本薬局方 **センナ末** 第②類医薬品

【効能・効果】

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

【用法・用量】

次の量を水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	用法・用量
成人 (15歳以上)	1日1回 0.375g~0.75gをなるべく就寝前に服用する。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら少しずつ増量又は減量する。
15歳未満	服用しないこと

【成分・分量】

1日量 0.75g中 日本薬局方 センナ末 0.75g

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

<http://www.pmda.go.jp/>

H25

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
4. 本品は、気密な袋に脱酸素剤を入れて保存性を高めてありますが、開封後は次の点に御注意ください。
・なるべくお早めに御使用ください。
・確実に封止して保管してください。(吸湿防止・虫や異物の混入防止)

◎尚、本品に異常がありましたら弊社まで御連絡ください。

H29