仏法僧印

第3類医薬品

日本薬局方

センブリ末

販売名：高砂センブリ末

LOT.

内容量 500g

スプーン入

脱酸素剤入（内袋の外）

内袋

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20
お客様相談窓口 TEL 072-977-7151
（9～17時、土・日・祝日を除く）

4 987574 140102

JAN 高砂センブリ末 500g

日本薬局方 **センブリ末** 第3類医薬品

相談すること

⚠ 使用上の注意

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
   - 医師の治療を受けている人.
2. 5～6日服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この記載文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

服用目的	【効能又は効果】	【用法及び用量】	
		成人（15歳以上）	15歳未満
健胃	胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき	1回量 0.015 g、1日3回、食前または食間に服用する。（食間とは、食後2～3時間）	服用しないこと
止瀉	下痢、消化不良による下痢、くだり腹、軟便	1回量 0.3 g、1日3回を限度として服用する。 服用間隔は4時間以上おくこと。	

販売名： 高砂センブリ末 版記号1406-2

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/
☎ 0120-149-931（フリーダイヤル）

版記号0811

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
4. 本品は、気密な袋に脱酸素剤を入れて保存性を高めてありますが、開封後は次の点に御注意ください。
   - なるべくお早めに御使用ください。
   - 確実に封止して保管してください。
   （吸湿防止・虫や異物の混入防止）

◎尚、本品に異常がありましたら弊社まで御連絡ください。

H29