仏法僧印

第2類
医薬品

日本薬局方

ダイオウ末

販売名：
高砂ダイオウ末

LOT.

内容量 500g

スプーン入

脱酸素剤入
(内袋の外)

内袋

高砂薬業株式会社
大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20
お客様相談窓口 TEL 072-977-7151
（9～17時、土･日･祝日を除く）

4 987574 140119

JAN 高砂ダイオウ末 500g

⚠ 使用上の注意

⊗【してはいけないこと】

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品は使用しないでください。
   ・他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. [用法及び用量] に示す量よりも過剰に服用しないでください。

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
   (1) 医師の治療を受けている人.
   (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人.
   (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人.
   (4) 次の症状のある人 ―― はげしい腹痛、吐き気･嘔吐.
   (5) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）.
   (6) 胃腸が弱く下痢しやすい人.
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症　状
皮ふ	発疹･発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気･嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 ―― **下痢**
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

高砂ダイオウ末 H27

日本薬局方

ダイオウ末

第２類医薬品

販売名:高砂ダイオウ末

※ 別面の『使用上の注意』をよく読んで、正しく御使いください。

【効能 又は 効果】

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法 及び 用量】

成人（15歳以上）は1日1回0.75～1.5ｇをなるべく就寝前に服用する。ただし初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量する。

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http: // www . pmda . go . jp /
☎ 0120－149－931（フリーダイヤル）

H23

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
4. 本品は、気密な袋に脱酸素剤を入れて保存性を高めてありますが、開封後は次の点に御注意ください。
   ・なるべくお早めに御使用ください。
   ・確実に封止して保管してください。
   （吸湿防止・虫や異物の混入防止）

◎尚、本品に異常がありましたら弊社まで御連絡ください。

H29