

仙法僧印



第3類
医薬品

日本薬局方
ヨクイニン末 販売名：
高砂ヨクイニン末

LOT. 内容量 500g

スプーン入 脱酸素剤入
(内袋の外) 

高砂薬業株式会社
大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20
お客様相談窓口 TEL 072-977-7151
(9~17時、土・日・祝日を除く)



4 987574 140126

JAN 高砂ヨクイニン末 500g

日本薬局方 **ヨクイニン末**

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- (1) 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ・医師の治療を受けている人。
 - ・妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - ・今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (2) 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この記載文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- | 関係部位 | 消化器 | 皮膚 |
|------|-------|-----------|
| 症状 | 胃部不快感 | 発疹・発赤、かゆみ |
- (3) 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この記載文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ・下痢。
- (4) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この記載文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

H28

日本薬局方

ヨクイニン末

第3類
医薬品

※別面の『使用上の注意』をよく読んで、正しくお使いください。

【効能・効果】 いば、皮膚のあれ

【用法・用量】 次の量を、食前または食間に、水又はお湯と一緒に、服用してください。(食間とは、食後2~3時間)

年齢	1回量	1日服用回数
成人 (15歳以上)	2g	3回
15歳未満	服用しないこと	

[添付スプーンすりきり1杯が1回量の2g]

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

H28

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
4. 本品は、気密な袋に脱酸素剤を入れて保存性を高めてありますが、開封後は次の点に御注意ください。
 - ・なるべくお早めに御使用ください。
 - ・確実に封止して保管してください。(吸湿防止・虫や異物の混入防止)

◎尚、本品に異常がありましたら弊社まで御連絡ください。

H25