



日本薬局方

第3類医薬品

リユウタン末

販売名：
高砂リユウタン末

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - ・ 医師の治療を受けている人。
- しばらく服用しても症状がよくならない場合は、服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能又は効果】 胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

【用法及び用量】 成人(15歳以上)は1回量 0.15g、1日3回、食前または食間に服用する。

副作用被害 ☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)
救済制度 <http://www.pmda.go.jp/>

原研番号1406

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 本品は、気密な袋に脱酸素剤を入れて保存性を高めてありますが、開封後は次の点にご注意ください。
 - ・なるべくお早めに御使用ください。
 - ・確実に封止して保管してください。(吸湿防止・虫や異物の混入防止)

◎尚、本品に異常がありましたら弊社まで御連絡ください。

DEB