

PARESTAMIN 20DX

パレスタミン
20DX
尿素20%+かゆみ止め成分配合クリーム

120g

乾燥肌の繰り返す
かゆみを抑え
しっとり潤い肌へ



第2類医薬品

かゆみ止め成分
W配合
ジフェンヒドラミン
リドカイン

尿素
20%

皮膚やわらか成分（尿素）などが
うるおいのあるお肌にします

2種類のかゆみ止め成分が
乾燥肌によるかゆみを鎮めます



【保管および取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)キャップの閉め方が不十分な場合、クリームが乾燥し、ザラザラ感がでることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

製造
番号

使用
期限

発売元
ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆
フリーダイヤル 0120-86-8998

製造販売元
三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください

[使用上の注意]

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目のまわり、粘膜等 (2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位 (3)かさぶたのように皮ふがはがれている所 (4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください

(1)医師の治療を受けている人 (2)本人または家族がアレルギー体质の人 (3)薬や化粧品等によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

(2)2週間使用しても症状がよくならない場合

5つの成分が配合されています

リドカイン
かゆみ止め
成分

ジフェンヒドラミン
かゆみ止め
成分

尿素20%
うるおい
保湿成分

グリチル
レチン酸
消炎成分

トコフェロール
酢酸エステル
血行促進成分

【効能・効果】かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)

【用法・用量】1日1~数回、適量を患部に塗擦してください

(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください (2)小児(15歳未満)には使用させないでください (3)外用にのみ使用してください

【成分・分量】100g中 尿素…20g、リドカイン…2g、ジフェンヒドラミン…1g、グリチルレチン酸…0.3g、トコフェロール酢酸エステル…0.5g 添加物：DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エデト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、 β -メントール、香料

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931