

ご使用に際し、この説明書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください  
(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください  
(1)目のまわり、粘膜等 (2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位  
(3)かさぶたのように皮ふがはがれている所 (4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください  
(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

5つの有効成分配合

かゆみ止め成分 **ジフェンヒドラミン**    かゆみ止め成分 **リドカイン**    消炎成分 **グリチルリチン酸**

血行促進成分 **トコフェロール酢酸エステル**    保湿成分 **尿素20%**

【効 能】 かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)  
 【用 法】 1日1~数回、適量を患部に塗擦してください  
 (1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください (2)小児(15歳未満)には使用させないでください (3)外用にのみ使用してください  
 【成 分】100g中 尿素…20g、リドカイン…2g、ジフェンヒドラミン…1g、グリチルリチン酸…0.3g、トコフェロール酢酸エステル…0.5g  
 添加物:DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エデト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、ℓ-メントール、香料

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

かゆみを伴う乾燥性皮膚の治療に **パレスタミン20DX**

尿素20%+かゆみ止め成分W配合クリーム

有効成分が**乾燥肌**の繰り返す **かゆみ**を抑え、しっとり**潤い肌**へ

第2類医薬品

150g

かゆみを伴う乾燥性皮膚の治療に **パレスタミン20DX**

尿素20%+かゆみ止め成分W配合クリーム

有効成分が **乾燥肌**の繰り返す **かゆみ**を抑え、しっとり**潤い肌**へ

かゆみ止め成分 **W配合** **ジフェンヒドラミン** **リドカイン**

150g



消炎成分 **グリチルリチン酸**

保湿成分 **尿素20%**

**+VE配合**

第2類医薬品

皮膚や柔らか成分(尿素)などがうるおいのあるお肌にします 2種類のかゆみ止め成分が乾燥肌によるかゆみを鎮めます



【保管および取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください (2)小児の手の届かない所に保管してください (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になりたり品質が変わることがあります)
- (4)キャップの閉め方が不十分な場合、クリームが乾燥し、ザラザラ感があることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

製造番号 使用期限

製造販売元 **三友薬品株式会社** 東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆ お客様相談窓口 03-3899-9333



4 944661 118734