

5つの成分が配合されています

リドカイン
かゆみ止め
成分

尿素20%
うるおい
保湿成分

ジフェンヒドラミン
かゆみ止め
成分

トコフェロール
酢酸エステル
血行促進成分

グリチル
レチン酸
消炎成分


PARESTAMIN
20DX
MILK LOTION
パレストアミン20DX乳液

尿素20%+かゆみ止め成分配合乳液

120g

ここから
開けてください

広い範囲の
乾燥肌に



硬くなった
ひじ・ひざ
かかと
くるぶしに



ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください
(1)本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
(1)目のまわり、粘膜等(2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位 (3)かさぶたのように皮ふがはがれている所 (4)炎傷部位(ただれ・赤くはれている所)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください
(1)医師の治療を受けている人 (2)本人または家族がアレルギー体質の人 (3)薬や化粧品等によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください
(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ビリビリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

(2)2週間使用しても症状がよくなりません

【効能・効果】

かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部に塗布してください

- (1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください
- (2)小児(15歳未満)には使用させないでください
- (3)外用にのみ使用してください

【成分・分量】100g中

尿 素……………20g
 リドカイン……………2g
 ジフェンヒドラミン……………1g
 グリチルレチン酸……………0.3g
 トコフェロール酢酸エステル……………0.5g
 添加物：DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エデト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、ℓ-メントール、香料

【保管および取扱い上の注意】

- (1)直射日光当たらない涼しい所に密栓して保管してください (2)小児の手の届かない所に保管してください (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります) (4)キャップの開め方が不十分な場合、乳液が乾燥し、ザラザラ感がでることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

乾燥肌の繰り返し
かゆみを抑え
しっとり潤い肌へ

かゆみ止め成分
W配合
ジフェンヒドラミン
リドカイン

尿素
20%

【血行促進成分】


トコフェロール酢酸エステル

【消炎成分】


グリチルレチン酸

第2類医薬品

皮膚や柔らか成分(尿素)などが
うるおいのあるお肌にします



2種類のかゆみ止め成分が
乾燥肌によるかゆみを鎮めます



発売元
ラクル薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号
フリーダイヤル 0120-86-8998

お問い合わせ先
三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造
番号

使用
期限