

かゆみを伴う乾燥性皮膚の治療に

パスタミン 20DX 乳液

尿素20%+かゆみ止め成分W配合乳液

第2類医薬品

150g

かゆみを伴う乾燥性皮膚の治療に

パスタミン 20DX 乳液

尿素20%+かゆみ止め成分W配合乳液

150g

有効成分が乾燥肌の繰り返し かゆみを抑え、しっとり潤い肌へ

かゆみ止め成分
W配合
ジフェンヒドラミン
リドカイン

消炎成分
グリチルレチン酸

保湿成分
尿素20%

+VE配合

第2類医薬品

5つの有効成分配合

かゆみ止め成分
ジフェンヒドラミン


かゆみ止め成分
リドカイン

消炎成分
グリチルレチン酸


血行促進成分
トコフェロール
酢酸エステル

保湿成分
尿素20%

2種類のかゆみ止め成分が
乾燥肌によるかゆみを鎮めます



皮膚やわらか成分(尿素)などが
うるおいのあるお肌になります



製造販売元
三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆
お客様相談窓口 03-3899-9333

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

ここから
開けてください

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の人は使用しないでください
(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
- 次の部位には使用しないでください
(1)目のまわり、粘膜等
(2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位
(3)かさぶたのように皮ふがはがれている所
(4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

- 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

【効能】


かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)

【用法】

1日1~数回、適量を患部に塗布してください

- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください
- 小児(15歳未満)には使用させないでください
- 外用にのみ使用してください

広い範囲の
乾燥肌に



硬くなった
ひじ・ひざ
かかと
くるぶしに



【成分】100g中

尿 素……………20g
 リドカイン……………2g
 ジフェンヒドラミン……………1g
 グリチルレチン酸……………0.3g
 トコフェロール酢酸エステル……………0.5g
 添加物:DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エドト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、D-メントール、香料

【保管および取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- キャップの閉め方が不十分な場合、乳液が乾燥し、ザラザラ感がでることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください
- 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

製造
番号

使用
期限

