

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。

△ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人
 - 次の症状のある人 口内のひどいただれ
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 使用後、次の症状があらわれた場合
- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合


関係部位	症状
口	刺激感

効能・効果 口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去。

用法・用量 1回約1mLを約50mLの水にうすめて、1日数回うがいをする。

使いやすいポンプ式 1押し1mL

一般に使われているコップ(200mL)に薬剤を1mL(1回押し)入れて、水(50mL:約1/4)でうすめます。その液でうがいをしてください。
 [容器の使い方] ポンプのストッパー(青色)を手前に引いて取りはずすと、ポンプが使用可能な状態になります。数回空押しをしてポンプ内に液がたまると、1回に1mL薬液が出るようになります。



●一度はずしたストッパーは再度使用しないでください。

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

ヨード
不使用

洗浄・口臭の除去

のどの殺菌・消毒

リファレンザ®

Cetylpyridinium chloride hydrate

うがい薬

有効成分 CPC配合

セチルピリジウム
塩化物水和物

500mL
(約500回分)

製造発売元



大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

指定医薬部外品

キシリトール
リンゴ酸配合

販売名:CPCうがい薬タイヨー

F18-FL

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください
- 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- うがい用にのみ使用し、内服しないでください
- 原液のまま使用しないでください
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください

成分・分量 本品100mL中

セチルピリジニウム塩化物水和物……250mg
 添加物として、エタノール、キシリトール、DL-リンゴ酸、ステビアエキス、ℓ-メントール、リン酸水素ナトリウム水和物、香料

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください(車内等、高温になるおそれのある所には置かないでください)
- 小児の手が届かぬところに保管してください
- 他の容器に入れかえないでください
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください

製造番号

使用期限



ポンプ
ボトル
外装フィルム