

この説明書はお薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

添付文書改訂年月  
2012年1月

※必ず、お子様の手の届かないところに、このお薬を保管してください。

第②類医薬品

Ⓑ

# こどもせき止めシロップ「ヒシメイ」



## 使用上の注意

(せき止め薬)

本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと  
本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
(眠気等があらわれることがある。)



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 授乳中の人。
  - (4) 乳児(乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用した時に、ショック(アナフィラキシー)があらわれたとの報告がある。)
  - (5) 高齢者。
  - (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (7) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (8) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼 吸 器	息苦しさ、息切れ
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

(裏面もお読みください。)

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕  
せき、たん

〔用法・用量〕

年 齢	1 回 量
11歳以上15歳未満	1回 10mL
8歳以上11歳未満	1回 7.5mL
5歳以上8歳未満	1回 5mL
3歳以上5歳未満	1回 3.5mL
1歳以上3歳未満	1回 3mL
3カ月以上1歳未満	1回 1.5mL
3カ月未満	服用しないでください

1日3回食後又は食前に服用してください。更に就寝前に1回服用してもよい。必要な場合は1日6回まで服用しても差し支えないが、その場合には約4時間の間隔をおいて服用してください。

〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。  
(2) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

※本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈澱を生じることがありますが、よく振ってから服用してください。

〔成分・分量〕 60mL中

デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 40mg

dl-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg

リゾチーム塩酸塩 40mg (力価)


クオルフェニラミンマレイン酸塩 8mg

セネガ流エキス 400mg

添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、フマル酸Na、DL-リンゴ酸、メチルパラベン、プロピルパラベン、安息香酸Na、グリセリン、カラメル、エチルアルコール、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。  
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。  
(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)  
(4) 使用期限のすぎた製品は服用しないこと。  
(5) 開封後の長期保存による使用は避けること。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

：明治薬品株式会社

電 話：(03) 3253-3451

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

発売元

**REINYO 金陽製薬株式会社**  
奈良県五條市中町345

製造販売元

**明治薬品株式会社**  
富山県富山市三郷6番地

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)