

チクナイン錠

項目	内容												
医薬品区分	一般用医薬品												
薬効分類	辛夷清肺湯												
承認販売名													
製品名	チクナイン錠												
製品名(読み)	チクナインジョウ												
製品の特徴													
使用上の注意	<p>■相談すること</p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人</p> <p>(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人</p> <p>(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)</p> <p>(4) 胃腸虚弱で冷え症の人</p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消化器</td> <td>食欲不振、胃部不快感</td> </tr> </tbody> </table> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>症状の名称</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>間質性肺炎</td> <td>階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする</td> </tr> <tr> <td>肝機能障害</td> <td>発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる</td> </tr> <tr> <td>腸間膜静脈硬化症</td> <td>長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <p>4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p>	関係部位	症 状	消化器	食欲不振、胃部不快感	症状の名称	症 状	間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする	肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる	腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる
関係部位	症 状												
消化器	食欲不振、胃部不快感												
症状の名称	症 状												
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする												
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる												
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる												
効能・効果	体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症： 鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症(副鼻腔炎)												
効能関連注意													
用法・用量	<p>次の量を朝夕、食前又は食間に水又はお湯で服用してください</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 齢</th> <th>1回量</th> <th>服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大人(15才以上)</td> <td>5錠</td> <td>1日2回</td> </tr> <tr> <td>15才未満</td> <td colspan="2">× 服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table>	年 齢	1回量	服用回数	大人(15才以上)	5錠	1日2回	15才未満	× 服用しないこと				
年 齢	1回量	服用回数											
大人(15才以上)	5錠	1日2回											
15才未満	× 服用しないこと												
用法関連注意	<p>(1) 定められた用法・用量を厳守すること</p> <p>(2) 吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとしめること</p> <p>●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます</p>												

成分分量	<p>1日量(10錠)中 辛夷清肺湯エキス・・・2.5g</p> <table border="0"> <tr> <td>シンイ・・・1.5g</td> <td>チモ・・・1.5g</td> </tr> <tr> <td>ビャクゴウ・・・1.5g</td> <td>オウゴン・・・1.5g</td> </tr> <tr> <td>サンシシ・・・0.75g</td> <td>バクモンドウ・・・3.0g</td> </tr> <tr> <td>セッコウ・・・3.0g</td> <td>ショウマ・・・0.75g</td> </tr> <tr> <td>ビワヨウ・・・0.5g</td> <td>より抽出</td> </tr> </table>	シンイ・・・1.5g	チモ・・・1.5g	ビャクゴウ・・・1.5g	オウゴン・・・1.5g	サンシシ・・・0.75g	バクモンドウ・・・3.0g	セッコウ・・・3.0g	ショウマ・・・0.75g	ビワヨウ・・・0.5g	より抽出
シンイ・・・1.5g	チモ・・・1.5g										
ビャクゴウ・・・1.5g	オウゴン・・・1.5g										
サンシシ・・・0.75g	バクモンドウ・・・3.0g										
セッコウ・・・3.0g	ショウマ・・・0.75g										
ビワヨウ・・・0.5g	より抽出										
添加物	CMC-Ca、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、タルク、二酸化ケイ素										
保管及び取扱い上の注意	<p>(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること</p> <p>(2)小児の手の届かない所に保管すること</p> <p>(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)</p> <p>(4)本剤をぬれた手で扱わないこと</p> <p>(5)ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること</p>										
消費者相談窓口	<p>発売元 小林製薬株式会社 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 製品のお問合せ先(お客様相談室) 0120-5884-01 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)</p>										
製造販売会社	<p>製造販売元 小林製薬株式会社 〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3</p>										
販売会社											
剤形	錠剤										
リスク区分等	第2類医薬品										