

## 第②類医薬品

## ゼリスかぜ内服液「小児用」

## かぜ薬

ゼリスかぜ内服液「小児用」は生薬のニンジンエキス、オウヒエキスをはじめ風邪の諸症状を緩和するために必要な解熱鎮痛・鎮咳薬を合理的に配合したシロップ薬です。又、ビタミンB<sub>2</sub>を加えてありますので、体力の回復を助けます。

## ⚠ 使用上の注意

(本剤は小児用ですが、かぜ薬として一般的な注意事項を記載しています。)

## してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

## 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (2) 本剤又は他のかぜ薬・解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

## 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

## 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。)

## 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

## 5. 服用前後は飲酒しないでください

## 6. 長期連用しないでください

## 相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
 (3) 高齢者。  
 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (5) 次の症状のある人。  
 高熱、排尿困難  
 (6) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

## 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、 中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけで息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をすするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
- 4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

## 【用法・用量】

次の1回量を1日3回毎食後、必要な場合には就寝前に服用します。また、止むを得ない場合には、1日6回まで服用できますが、この場合には約4時間の間隔をおいてください。

添付の計量カップではかって服用してください。

年 齢	1回量
3歳以上7歳未満	5mL
6ヵ月以上3歳未満	3mL
6ヵ月未満	服用しないこと

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)7歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。

## 【成分・分量】本品1日量1本(30mL)中

アセトアミノフェン	300mg
クロルフェニラミンマレイン塩酸	2.5mg
ジヒドロコデインリン酸塩	8mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg
無水カフェイン	25mg
リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	2mg
オウヒエキス(オウヒとして0.25g)	10mg
ニンジンエキス(ニンジンとして0.333g)	30mg

添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、アルコール、プロピレングリコール、香料を含有します。

### <成分・分量に関連する注意>

配合成分のビタミンB<sub>2</sub>により、尿が黄色になることがあります。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

### 【お客様相談窓口】

商品に関するご質問・お問い合わせ  
大生堂薬品工業株式会社 お客様相談室  
☎ 058-271-9481  
(9:00～17:00 土・日・祝日を除く)



製造販売元  
大生堂薬品工業株式会社  
岐阜市六条大溝3丁目3番17号