

\*:2009年12月改訂

第2類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ず読むこと  
必要時に読めるように大切に保管すること

イソプロピルアンチピリン配合 総合感冒薬

# プレコール® 持続性カプセル

1日2回朝・夜服用



〔プレコール持続性カプセルの特徴〕

- 朝食・夕食後の1日2回の服用で、すぐれた効果を発揮するように設計した持続性カプセルです
- 7種の成分がバランスよく働いて、かぜの諸症状に効果を発揮する総合感冒薬です

## ⚠〔使用上の注意〕



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないでください
  - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去たん薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
- 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがある)
- 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 服用時は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師にご相談ください
  - 医師または歯科医師の治療を受けている人
  - 妊婦または妊娠していると思われる人
  - 高齢者
  - 本人または家族がアレルギー体質の人
  - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人：高熱、排尿困難
  - 次の診断を受けた人：甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振、上腹部痛、胸やけ
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しき等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること)
ぜんそく	

- 5~6回服用しても症状がよくならない場合
- 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください  
便秘、口のかわき

【効能】

かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、鼻水、鼻づまり、せき、たん、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み、くしゃみ）の緩和

【用法・用量】

次の量を、水またはお湯で服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2カプセル	2回 (朝食・夕食後なるべく30分以内)
15歳未満	服用しないこと	

- (1) 用法・用量を厳守してください
- (2) カプセルの取り出し方

図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる）



【成分・分量】

本剤は、黄色と白色のカプセルで、2カプセル中に次の成分を含有する

成分	2カプセル中	働き
イソプロピルアンチピリン (ピリン系)	150mg	熱を下げ痛みをおさえる
アセトアミノフェン	225mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.75mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみをおさえる
ジヒドロコデインリン酸塩	6mg	せきをしずめる
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg	せきをしずめ、たんをおさえる
カンゾウエキス末	59mg (原生薬として491.5mg)	かぜの諸症状を緩和する生薬
無水カフェイン	37.5mg	頭痛をやわらげる

添加物：乳糖水和物，ヒドロキシプロピルセルロース，トウモロコシデンプン，二酸化ケイ素，メタクリル酸共重合体L，ステアリン酸，タルク，セルロース，CMC-Ca，ゼラチン，ラウリル硫酸Na

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わる）
- (4) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い致します

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8  
電話 03 (6667) 3232  
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



製造販売元  
第一三共ヘルスケア株式会社  
東京都中央区日本橋小網町1-8