

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

総合かぜ薬

**エザックエース**
 のどの痛み  
熱に

第2類医薬品

- ・熱や痛みに良く効くインプロピルアンチピリンや、のど粘膜炎の炎症を抑えるグリチルリチン酸など4種類の基準外成分を配合していますので、かぜの諸症状に優れた効果を発揮します。
- ・発熱時に失われるビタミンC、ビタミンB<sub>2</sub>を配合しています。
- ・5才のお子様から服用でき、飲みやすい錠剤です。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
  - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
 

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください。
 

(眠気があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は、本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください。
5. 服用時には飲酒しないでください。
6. 長期連用しないでください。



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
  - (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる婦人
  - (3) 高齢者
  - (4) 本人または家族がアレルギー体質の人
  - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (6) 次の症状のある人 —— 高熱、排尿困難
  - (7) 次の診断を受けた人 —— 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症	状	関係部位	症	状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ		精神神経系	めまい	
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃痛		そ の 他	排尿困難	

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、やけど様の水ぶくれなどの激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)などがあらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

**3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強がみられた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。**

口のかわき、下痢

**■効 能**

かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み、悪寒、せき、たん、くしゃみ、鼻水、鼻づまり）の緩和

**■用法・用量**

次の1回量を、1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数	年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回	5～10歳	1錠	3回
11～14歳	2錠		5歳未満の乳幼児	服用しないこと	

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3) 本剤は、内核が腸溶性の有核錠なので、かんだり、つぶしたりせずそのまま服用してください。また、制酸剤または牛乳と同時に服用しないでください。

**■成分・分量**

9錠中、次の成分を含みます。

成 分	含 量	は た ら き
イソプロピルアンチピリン (IPA)	300mg	熱を下げ、のどの痛み・頭痛・関節の痛み・筋肉の痛みなどをおさえます。
アセトアミノフェン	450mg	
クレマスチンフマル酸塩	1.34mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなど、かぜのアレルギー症状をおさえます。
フェンジソ酸クロベラスチン	84mg	せきの中樞に働き、せきをおさえます。
ノスカピン	48mg	
dI-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげて、せきをしずめます。
L-エチルシステイン塩酸塩	300mg	気道内のたんを溶解して、ねばりけを下げ、出しやすくします。
グリチルリチン酸	39mg	のどや鼻の粘膜の炎症をしずめ、アレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。
アスコルビン酸 (ビタミンC)	500mg	発熱時に失われるビタミンCを補給します。
リボフラビン (ビタミンB <sub>2</sub> )	12mg	発熱時に失われるビタミンB <sub>2</sub> を補給します。

添加物として、リン酸水素カルシウム水和物、ヒプロメロースフタル酸エステル、ステアリン酸Mg、メタクリル酸コポリマー-L、クエン酸トリエチル、タルク、トウモロコシデンプン、セルロース、カルメロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ケイ酸Ca、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、三酸化鉄、カルナウバロウを含有する。

※イソプロピルアンチピリンはピリン系解熱鎮痛薬で、大衆薬としてかぜ薬や解熱鎮痛薬に配合されています。

**■保管および取り扱い上の注意**

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) びんのつめものは、製品の破損を防ぐためのものです。開封後は取り除いてください。

(5) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

**■包 装** [ビン入]

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室

T E L 076-435-0878

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931