

この説明書は、お薬とともに保管し、
ご使用の際には、よくお読みください。

鎮咳去痰薬

第2類医薬品

せき、たん、ぜんそくに

アストーマゴールド

アストーマゴールドは、のどや気管支などの炎症、刺激によっておこるせきだけではなく、ぜんそく発作時、アレルギー性のせきをしずめ、たんの排出をうながす成分を配合した、服用しやすい小型のカプセル剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気があらわれることがあります。）



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	動悸、排尿困難

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
 のかわき

【効能・効果】

せき, たん, ぜんそく

【用法・用量】

下記の量を食後なるべく30分以内に水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	2カプセル	3回
8歳以上15歳未満	1カプセル	3回
8歳未満	服用しないこと	

（用法・用量に関連する注意）

・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

・カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

**【成分と働き】**

アストマゴールドは、白色の硬カプセル剤で、次の4種類の成分を含んでいます。添加物として乳糖水和物、ケイ酸アルミニウム、ステアリン酸マグネシウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有します。

また、カプセル本体にゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸ナトリウムを含有します。

成 分	2カプセル中	作 用
メトキシフェナミン塩酸塩	35mg	気管支筋のけいれんをおさえ、ぜんそく発作時のせきをしずめます。たんの排出を助けます。
ノスカピン	14mg	せきをおさえます。
ジプロフィリン	30mg	気管支筋のけいれんをゆるめ、呼吸を楽にすると共にたんを出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	4mg	アレルギー性のせきに効果を示します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

(4)使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

この製品をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口 新新薬品工業株式会社 CHC事業部
富山県富山市今市324番地
電話番号 076-435-0878
受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元

新新薬品工業株式会社
富山県富山市今市324番地