

鼻炎用薬

くしゃみ・鼻みず・鼻づまり・なみだ目・頭重に

第2類医薬品

新ビノック^{鼻炎}用カプセル

New BIKNOCK Capsules for RHINITIS

くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、頭重などは、鼻かぜやアレルギー性鼻炎による諸症状です。鼻炎は鼻の粘膜が腫れあがって、空気の通過を妨害しますので、気分がすぐれないばかりか、睡眠不足、過労、注意力・集中力・根気力の低下など、日常生活を不快にします。

新ビノック鼻炎用カプセルは、これらの諸症状を緩和して、効き目をあらわします。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2)次の症状がある人
前立腺肥大による排尿困難
 - (3)次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
4. 長期連用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)高齢者
 - (4)本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6)次の症状のある人
高熱、排尿困難
 - (7)次の診断を受けた人
緑内障
 - (8)モノアミン酸化酵素阻害剤（塩酸セレギリン等）で治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
そ の 他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

- (2)5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

□のかわき、便秘

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：

くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重

【用法・用量】

下記の量を食後に水又はお湯と一緒に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)カプセルの取り出し方：

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成分と働き】

3カプセル（1日量）中に次の成分を含んでいます。

成分	3カプセル中	作用
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	4.5 mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状を鎮めます。
塩酸プソイドエフェドリン	105 mg	鼻粘膜の充血や腫れを抑え、鼻づまりを改善します。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4 mg	粘液の分泌を抑制するので、鼻水やなみだ目を改善します。
無水カフェイン	120 mg	脳血管に働いて、頭重を鎮めます。
サイシン乾燥エキス (生薬換算量)	300 mg	アレルギー症状、のどの痛みを鎮めます。

添加物としてカプセル内容物にバレイシヨデンブ、乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、また、カプセル本体に青色1号、赤色3号、ラウリル硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム、ゼラチンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
4. 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

この製品をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口 新新薬品工業株式会社 CHC事業部
富山県富山市今市324番地
電話番号 076-435-0878
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元 新新薬品工業株式会社
富山県富山市今市324番地