

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

胃腸薬

第2類医薬品 弱った胃に効き、腸の状態を正常に近づける

第一三共胃腸薬プラス細粒

第一三共胃腸薬プラス細粒の特徴

「胃」と「腸」をダブルケアするタイプの胃腸薬です。
6つの生薬成分が弱った「胃」に効き、植物性の乳酸菌
「ラクボン」が「腸」の状態を正常に近づけます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の診断を受けた人
腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

- もたれ、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸つかえ、食欲不振
- 胸やけ、胃痛、胃酸過多、胃重、胃部不快感、げっぷ
- 消化不良、消化促進、胃弱、胃部・腹部膨満感
- はきけ（むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、嘔吐
- 整腸（便通を整える）、軟便、便秘



もたれに



整腸に

用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	3回 食後に服用して下さい。
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上8歳未満	1/3包	
3歳以上5歳未満	1/4包	
3歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量

本剤は、白色～わずかに黄褐色を帯びた白色の細粒と淡褐色～褐色の細粒の分包品で、特異なおいがあり、3包（1包1.3g）中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
タカジアスターゼN1	150mg	広いpH域ではたらく消化酵素で、消化を助け、栄養の吸収をよくします。
リパーゼAP12	60mg	脂肪消化酵素で胃の消化機能を助けます。
有孢子性乳酸菌 (ラクボン原末)	60mg	乳酸菌の孢子を製剤化したもので、安定性がよく、服用後は腸管内で繁殖して腐敗菌などの有害細菌の増殖をおさえて、整腸作用を発揮します。
ケイ酸アルミン酸 マグネシウム	900mg	持続的・速効的な制酸作用により、胸やけ、げっぷなどの過酸症状を改善します。
合成ヒドロタルサイト	600mg	
沈降炭酸カルシウム	600mg	
オウバク末	105mg	味や香りによって味覚を刺激し、胃液や消化液の分泌を調節し、消化を助けます。
ケイヒ末	225mg	
ショウキョウ末	75mg	
チョウジ末	30mg	
ウイキョウ末	60mg	
l-メントール	9mg	
アルジオキサ	60mg	胃粘膜のあれやただれの修復を助けます。
カンゾウ末	150mg	

添加物：セルロース、乳糖、ポリソルベート80、ヒドロキシプロピルセルロース、サンショウ

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

06