

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

胃腸薬

第2類医薬品

胃のもたれ・不快感にスーッととけて効く

新三共胃腸薬〔細粒〕

《新三共胃腸薬〔細粒〕》は、

次のような働きをもった薬剤で、胃のもたれ・不快感、整腸などにお使いいただけます。

- 脂肪消化酵素リパーゼAP12と消化酵素タカチアスターゼN1が、消化を助けます。
- 6種の健胃生薬が弱った胃の働きを高め、胃の不快感・食欲不振などに効きめをあらわします。
- 有孢子性乳酸菌(ラクボン原末)が、腸管内によく移行し、腸の働きを整えます。
- 生薬アカメガシワ、カンゾウ末が胃粘膜のあれ・ただれを修復します。
- 塩分のもととなるナトリウムを含んでいません。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の診断を受けた人
腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |

 - (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
便秘、下痢

効能・効果

- もたれ、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸つかえ、食欲不振
- 胸やけ、胃痛、胃酸過多、胃重、胃部不快感、げっぷ
- 消化不良、消化促進、胃弱、胃部・腹部膨満感
- はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐
- 整腸(便秘を整える)、軟便、便秘



もたれに



胃部不快感に



整腸に

用法・用量

| 年齢 | 1回服用量 | 1日服用回数 |
|------------|-----------|------------------|
| 15歳以上 | 1包 | 3回 食後に服用して下さい |
| 11歳以上15歳未満 | 2/3包 | |
| 8歳以上11歳未満 | 1/2包 | |
| 5歳以上8歳未満 | 1/3包 | |
| 3歳以上5歳未満 | 1/4包 | |
| 3歳未満 | 服用しないで下さい | |

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分

《新三共胃腸薬〔細粒〕》は、白色～わずかに黄褐色を帯びた白色の細粒及び淡褐色～褐色の細粒の混合物の分包品で、特異なにおいと味があります。3包(3.9g)中に次の成分を含有しています。

| 成分 | 含量 (3包中) | 作用 |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| タカチアスターゼN1 | 150mg | 広いpH域で働く消化酵素で、消化を助け、栄養の吸収をよくします |
| リパーゼAP12 | 60mg | 脂肪消化酵素で、消化作用をあらわします |
| 有孢子性乳酸菌 (ラクボン原末) | 45mg | 乳酸菌の孢子を製剤化したもので、保存によく耐え、服用後は腸管内で繁殖して腐敗菌などの有害細菌の増殖を抑えて、整腸作用を発揮します |
| アカメガシワエキス | 63mg <small>(アカメガシワとして504mg)</small> | 胃腸の過度の緊張を抑えて、胃粘膜を保護し、胃の炎症を鎮めます |
| カンゾウ末 | 150mg | |
| ケイ酸アルミン酸 マグネシウム | 1200mg | 持続的な制酸作用を有し、かつ胃粘膜の炎症面を保護する働きもあります。また、合成ヒドロタルサイトは速効性もかねそなえています |
| 合成ヒドロタルサイト | 450mg | |
| 水酸化マグネシウム | 600mg | 速効的な制酸作用を有し、胸やけ、げっぷなどの過酸症状を改善します |
| オウバク末 | 105mg | 味や香りによって味覚を刺激し、胃液や消化液の分泌を調節し、消化を助けます |
| ケイヒ末 | 225mg | |
| ウイキョウ末 | 60mg | |
| チョウジ末 | 30mg | |
| ショウキョウ末 | 75mg | |
| l-メントール | 9mg | |

添加物：セルロース、乳糖、ポリソルベート80、ヒドロキシプロピルセルロース、サンショウ

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 1包を分割した残りをを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用して下さい。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電話 03 (6667) 3232
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

T06



製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋小網町1-8