

この説明文書は服用前に必ずお読み下さい。
また必要なとき読めるように保存しておいて下さい。

1

胃もたれ・胸やけに

総合胃腸薬

第2類医薬品

シオノギ®胃腸薬K 細粒

シオノギ製薬

- ◇ 胃腸機能を調整するカルチニン塩化物と5種類の健胃生薬が、弱った胃の働きを高め、胃もたれ、食欲不振などに効果をあらわします。また、アカメガシワ末が腸の働きを整えます。
- ◇ 葉緑素由来成分である銅クロロフィリンナトリウムが荒れた胃粘膜の修復を助けます。
- ◇ でんぷん、たんぱく質、脂肪それぞれの消化酵素を配合しています。
- ◇ 4種類の制酸成分の組み合わせにより、胸やけや胃痛などの過酸症状を改善します。
- ◇ さまざまな胃腸の不快感症状にすぐれた効果を発揮するように、15種類の有効成分を配合したのみやすい細粒状の総合胃腸薬です。
- ◇ 配合している制酸剤はアルミニウムを含んでいません。(アルミニウムフリー)



使用上の注意……

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい
(母乳に移行して、乳児の脈が速くなることがあります)

相談すること



1. 次の人は服用前に医師または薬剤師にご相談下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (5) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人
 - (6) 次の症状のある人
排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談下さい
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談下さい
口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります

……効能・効果……

- もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、胃部・腹部膨満感、胃弱
- 食欲不振(食欲減退)、消化不良、消化促進、食べ過ぎ(過食)
- 胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)
- 胃部不快感、げっぷ(おくび)、胃重、胃痛、胃酸過多

……用法・用量……

次の量を食後におのみ下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
5才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

……成分・分量……

シオノギ胃腸薬K 細粒は、淡緑色と茶褐色の細粒状混合物です。味は、清涼感とやや塩味があり、3包（1.4g×3・成人1日量）中に次の成分を含有しています。

成分	含量(3包中)	はたらき
カルニチン塩化物	200mg	胃腸の働きを活発にします
ケイヒ末	300mg	健胃生薬の効果で、胃腸の働きを活発にし、胃もたれ、胃弱、食欲不振などの不快な症状を改善します
チョウジ末	50mg	
ゲンチアナ末	50mg	
ガジュツ末	50mg	
ニンジン末	100mg	
アカメガシワ末	300mg	腸の働きを整えます
銅クロロフィリンナトリウム	45mg	荒れた胃粘膜の修復を助けます
ピオチアスターゼ	60mg	でんぷん、たんぱく質、脂肪の三大栄養素の消化を助けます
プロザイム	20mg	
リパーゼAP6	60mg	
炭酸水素ナトリウム	800mg	過剰な胃酸を中和し、胸やけ、むかつき、胃痛などの胃の不快な症状を改善します
沈降炭酸カルシウム	800mg	
炭酸マグネシウム	500mg	
ロートエクス3倍散 (ロートエキスとして)	90mg (30mg)	胃酸の分泌を抑え、痛みを和らげます

添加物として D-マンニトール、ケイ酸カルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、センブリ末、グリチルリチン酸、ハッカ油、L-メントール、バレシヨテンブ、デキストリンを含有しています。

……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用して下さい。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
 塩野義製薬株式会社「**医薬情報センター**」
 電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
 受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

……包装……

シオノギ胃腸薬K 細粒：16包（1.4g×16包）
 32包（1.4g×32包）

®：登録商標

販売元

塩野義製薬株式会社
 大阪市中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元

ダイト株式会社
 富山県富山市八日町326番地