

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

みづむし・たむし用薬

ピロエース[®] クリーム

ピロエースクリームの特徴

- 殺真菌成分「ラノコナゾール」が、患部に良く浸透し、角質が厚くなってしまったみづむしにも効果を発揮します。長時間患部に貯留し、1日1回の使用で効果をあらわします。
- 「クロタミトン」が、患部の不快なかゆみをしずめます。
- 「I-メントール」が、患部にスーとした清涼感を与え、かゆみをしずめます。
- 「イソプロピルメチルフェノール」が、かきこわしなどによる患部の二次感染を防ぎます。
- 「グリチルレチン酸」が、患部の炎症をおさえます。
- さまざまな症状に塗りやすい伸びのよいクリーム剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人には使用しないで下さい。
(1)本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人
- 次の部位には使用しないで下さい。
(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、瞼等)、陰のう、外陰部等
(2)しつしん
(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

- 次の人には使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1)医師の治療を受けている人
(2)乳幼児
(3)本人又は家族がアレルギー体質の人
(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5)患部が顔面又は広範囲の人
(6)患部が化膿している人
(7)「しつしん」か「みづむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、しつしん等他の原因による場合が多い)
(8)妊娠又は妊娠していると思われる人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、水疱、亀裂、乾燥・つっぱり感、ただれ

なお、「むくみ、息苦しさ」があらわれた場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

- 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、使用後、症状がかえって悪化した場合(ただれたり、化膿したり、病巣が前より広がる等)

効能・効果

みづむし、いんきんたむし、ぜにたむし

使 用 法

1日1回、適量を患部に塗布して下さい。

〈使用法に関する注意〉

- (1)2週間位使用しても症状がよくならない場合や、使用後、症状がかえって悪化した場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。
- (3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (5)外用にのみ使用して下さい。

患部をよく洗ってから患部より広めに薬剤を塗布して下さい。菌の増殖や二次感染を防ぐため患部を清潔に保ちましょう。足は不潔になりやすいので特に清潔にして下さい。また、再発しやすい病気ですから、自覚症状がなくなってからも2~4週間は治療を続けることが大切です。

成 分・分 量


100g中

成 分	分 量
ラノコナゾール	1.0g
イソプロピルメチルフェノール	0.3g
クロタミトン	5.0g
グリチルレチン酸	0.5g
I-メントール	1.0g

添加物:セタノール、ステアリルアルコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、パラベン、BHT

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 03(5205)8331

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo

東京都中央区日本橋 3-14-10

製造販売元

日本農薬株式会社

東京都中央区日本橋 1-2-5