

\*2014年1月改訂

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限(パッケージ底面およびビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと

生活習慣などによる  
肥満症を改善する

# ナイシトルG

販売名: ナイシトルG

漢方製剤 第2類医薬品

## 製品特徴

このお薬は、体に脂肪が付きすぎた、いわゆる脂肪太りで、  
特におなかに脂肪がたまりやすい方、便秘がちな方に適しています  
○3100mgの有効成分(防風通聖散料エキス)が、おなかの脂肪の分解・燃焼を促します  
○生活習慣などによる肥満症や、高血圧や肥満に伴うむくみ・便秘の改善に効果があります

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること



### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
  - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
  - (5) 発汗傾向の著しい人
  - (6) 高齢者
  - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人
  - (8) 次の症状のある人  
むくみ、排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	*吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、*腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
*精神神経系	*めまい
*その他	*発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる

(裏面につづく)

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること：下痢\*便秘
4. 1ヶ月くらい(便秘に服用する場合には1週間くらい)服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

## 効能・効果

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：肥満症、高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮ふ炎、ふきでもの(にきび)

## 用法・用量

次の量を食前または食間に水またはお湯で服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	4錠	3回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとしめること
- 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

## 成分・分量

1日量(12錠)中

防風通聖散料乾燥エキス…3.1g

<原生薬換算量>

トウキ……………0.74g	シャクヤク……………0.74g
センキュウ……………0.74g	サンシシ……………0.74g
レンギョウ……………0.74g	ハッカ……………0.74g
ショウキョウ……………0.19g	ケイガイ……………0.74g
ポウフウ……………0.74g	マオウ……………0.74g
ダイオウ……………0.93g	硫酸ナトリウム十水塩…0.93g
ビャクジュツ……………1.24g	キキョウ……………1.24g
オウゴン……………1.24g	カンゾウ……………1.24g
セッコウ……………1.24g	カッセキ……………1.86g

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプン含有する

- 本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと
- (5) ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**  
 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10  
 ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先 (お客様相談室)  
 ☎ **0120-5884-01**  
 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**  
 〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3