

使用に際して、この説明書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面及びボトル裏面に記載)を過ぎた製品
は使用しないこと

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人：はげしい目の痛み
 - 眼球乾燥症候群(ドライアイ[※])の診断を受けた人

[※]医師から病名として診断を受ける程度の人を前提としています
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

効能・効果

目の洗浄、眼病予防
(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)

用法・用量

1日3~6回、1回5mLを用いて洗眼してください

<用法・用量に関連する注意>

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- コンタクトレンズを装着したまま使用しないこと
また再装着する場合は、洗眼してから10~15分程度あけること
- 洗眼カップは使用前後に水道水で充分に洗浄すること
カップに残った水分は自然乾燥をおすすめします
- 湿潤したものは使用しないこと
- 洗眼用のみ使用すること

成分・分量 100mL中

成分	分量	はたらき
イブシノン・アミノカプロン酸	200mg	抗炎症作用
ベルベリン塩化物水和物	2.5mg	
グリチルリチン酸二カルシウム	15mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	3mg	抗ヒスタミン作用
シアノコバラミン(ビタミンB12)	2mg	調節機能改善作用
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	10mg	代謝促進作用
L-アスパラギン酸カルシウム	50mg	
タウリン	50mg	
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	50mg	角膜保護作用

添加物として、ヒアルロン酸Na、ホウ酸、ホウ砂、ポリソルベート80、エデト酸Na、グリセリン、L-メントール、dl-カンフル、pH調節剤を含有する

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりとめて箱に入れて保管すること
- 小児の手の届かない所に保管すること
- 他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 洗眼カップは他の人と共用しないこと

まるごと洗って、
瞳をスッキリ清潔・健康に

販売名:アイボン[®] メディカル^a
第3類医薬品

Eyewash
洗眼薬

コンタクトをアイボン[®]メディカル^a
外した後に

1日働いたコンタクトの目の異物感等の原因となる汚れを、
9種類の有効成分配合の薬液が洗い流し、眼病を予防します

上向きカップで瞳をまるごと洗う

上向き洗眼

- ✓ 瞳をまるごと薬液で包みこむ
- ✓ 汚れ・ゴミをすみずみまで洗い流せる

ぴったりフィットカップ

- ✓ 上向きでも液もれしにくい
- ✓ 目のまわりが痛くなりにくい
- ✓ あとが残りにくい

使い方



薬液を洗眼カップの内側の線(5mL)まで入れる
カップを目にぴったり押し当てる
液がこぼれないよう、カップを目に押し当てたまま、頭を後ろにそらして上を向く
数回まばたきをして洗眼する
●使用後のカップは充分に洗って乾燥させる

注意事項

- 片方の目を洗った液で反対側の目を洗わないでください
- 30秒以上洗眼しないでください
- コンタクトレンズを装着されている場合は、使用前に必ずコンタクトレンズをはずすこと
- 使用前に目のまわりの化粧や汚れはきれいにふきとること
- 保存状態によって容器の口周辺にオレンジ色の結晶が付着することがあるので、その場合は清潔なガーゼ等で軽くふきとること
- コンタクトレンズを使っていない人も使用できます
- 液の色はベルベリン塩化物水和物とビタミンB12の色です
誤って衣服などに付着した場合は、なるべく早く水洗いしてください

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

あったらいいな
をカタチにする
小林製薬

アイボン[®]メディカル^a

コンタクトレンズを長時間使用していると目の不快感、目の疲れ等を感じやすくなります
アイボンメディカルは、アイボン最多、9種類の有効成分を配合し、1日働いた瞳の汚れをしっかりと洗い流して眼病を予防します

抗炎症成分

ベルベリン
塩化物水和物

角膜保護成分

コンドロイチン硫酸
エステルナトリウム

調節機能改善成分

ビタミンB12

+

代謝促進成分

ビタミンB6

代謝促進成分

L-アスパラギン酸カルシウム

代謝促進成分

タウリン

抗ヒスタミン成分

クロルフェニラミンマレイン酸塩


抗炎症成分

グリチルリチン酸二カルシウム

抗炎症成分

e-アミノカプロン酸

クール感のレベル



製品のお問合せは、お買い求めのお店
又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先 (お客様相談室)

0120-5884-01

9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

第3類医薬品

※防腐剤とはベンザルコニウム塩化物、パラベン等のことを指します