

服用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

漢方処方のかぜ薬

第2類医薬品

葛根湯エキス顆粒WS-R

漢方処方「葛根湯」はカッコン(葛根)、マオウ(麻黄)、タイソウ(大棗)、ケイヒ(桂皮)、シャクヤク(芍薬)、カンゾウ(甘草)、ショウキョウ(生姜)の7種類の生薬から構成されています。

【特 長】

- 体力中等度以上の方におすすめします。
- かぜのひきはじめに服用すると効果があります。
- 鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛等に効果があります。
- 眠くなる成分は入っていません。



鼻かぜ



頭痛



肩こり

⚠ 使用上の注意

⊗ 【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないで下さい：生後3カ月未満の乳児



【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人
(5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。






3. 1カ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法用量】

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包 	3回
7才以上15才未満	2/3包 	
4才以上 7才未満	1/2包 	
2才以上 4才未満	1/3包 	
2才未満	1/4包 	

<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
 - (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
 - (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。
- 「食間」とは食事と食事の間のこと、食後2～3時間経過したころをさします。

【成分分量】


3包（成人1日量）中

葛根湯エキス（4/5量）	3483mg		
カッコン	6.46g	マオウ	3.23g
タイソウ	3.23g	ケイヒ	2.42g
シャクヤク	2.42g	カンゾウ	1.62g
ショウキョウ	0.81g		

添加物としてマクロゴール、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の期限内に服用して下さい。



■お問い合わせ先
滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話：(0748) 88-3180（大代表）
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879