

ダスマック

項目	内容												
医薬品区分	一般用医薬品												
薬効分類	清肺湯												
承認販売名													
製品名	ダスマック												
製品名(読み)	ダスマック												
製品の特徴													
使用上の注意	<p>■相談すること</p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人</p> <p>(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人</p> <p>(3) 胃腸の弱い人</p> <p>(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人</p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <table border="1" data-bbox="523 1037 1453 1104"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮ふ</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> </tbody> </table> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること</p> <table border="1" data-bbox="528 1227 1461 1608"> <thead> <tr> <th>症状の名称</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>間質性肺炎</td> <td>階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする</td> </tr> <tr> <td>肝機能障害</td> <td>発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる</td> </tr> <tr> <td>腸間膜静脈硬化症</td> <td>長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <p>4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p>	関係部位	症 状	皮ふ	発疹・発赤、かゆみ	症状の名称	症 状	間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする	肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる	腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる
関係部位	症 状												
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ												
症状の名称	症 状												
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする												
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる												
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる												
効能・効果	体力中等度で、せきが続き、たんが多くて切れにくいもの 次の諸症: たんの多く出るせき、気管支炎												
効能関連注意													
用法・用量	<p>次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください</p> <table border="1" data-bbox="512 1984 1129 2085"> <thead> <tr> <th>年 齢</th> <th>1回量</th> <th>服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大人(15才以上)</td> <td>1包</td> <td>1日3回</td> </tr> <tr> <td>15才未満</td> <td colspan="2">× 服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table>	年 齢	1回量	服用回数	大人(15才以上)	1包	1日3回	15才未満	× 服用しないこと				
年 齢	1回量	服用回数											
大人(15才以上)	1包	1日3回											
15才未満	× 服用しないこと												

用法関連注意	<p><用法・用量に関連する注意> 定められた用法・用量を厳守すること ●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます</p>																
成分分量	<p>1日量(3包:6.0g)中 清肺湯エキス3.2g</p> <table border="0"> <tr> <td>オウゴン・・・1.0g</td> <td>キキョウ・・・1.0g</td> </tr> <tr> <td>ソウハクヒ・・・1.0g</td> <td>キョウニン・・・1.0g</td> </tr> <tr> <td>サンシシ・・・1.0g</td> <td>テンモンドウ・・・1.0g</td> </tr> <tr> <td>バイモ・・・1.0g</td> <td>チンピ・・・1.0g</td> </tr> <tr> <td>タイソウ・・・1.0g</td> <td>チクジョ・・・1.0g</td> </tr> <tr> <td>ブクリョウ・・・1.5g</td> <td>トウキ・・・1.5g</td> </tr> <tr> <td>バクモンドウ・・・1.5g</td> <td>ゴミシ・・・0.25g</td> </tr> <tr> <td>ショウキョウ・・・0.25g</td> <td>カンゾウ・・・0.5g</td> </tr> </table> <p>より抽出（添加物：デキストリンを含む）</p>	オウゴン・・・1.0g	キキョウ・・・1.0g	ソウハクヒ・・・1.0g	キョウニン・・・1.0g	サンシシ・・・1.0g	テンモンドウ・・・1.0g	バイモ・・・1.0g	チンピ・・・1.0g	タイソウ・・・1.0g	チクジョ・・・1.0g	ブクリョウ・・・1.5g	トウキ・・・1.5g	バクモンドウ・・・1.5g	ゴミシ・・・0.25g	ショウキョウ・・・0.25g	カンゾウ・・・0.5g
オウゴン・・・1.0g	キキョウ・・・1.0g																
ソウハクヒ・・・1.0g	キョウニン・・・1.0g																
サンシシ・・・1.0g	テンモンドウ・・・1.0g																
バイモ・・・1.0g	チンピ・・・1.0g																
タイソウ・・・1.0g	チクジョ・・・1.0g																
ブクリョウ・・・1.5g	トウキ・・・1.5g																
バクモンドウ・・・1.5g	ゴミシ・・・0.25g																
ショウキョウ・・・0.25g	カンゾウ・・・0.5g																
添加物	ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、トメントール、プロピレングリコール、乳糖																
保管及び取扱い上の注意	<p>(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること (2)小児の手の届かない所に保管すること (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)</p>																
消費者相談窓口	<p>発売元 小林製薬株式会社 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 製品のお問合せ先(お客様相談室) 0120-5884-01 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)</p>																
製造販売会社	<p>製造販売元 小林製薬株式会社 〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3</p>																
販売会社																	
剤形	その他																
リスク区分等	第2類医薬品																