

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要などきに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面およびチューブ底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

肛門のぶり返すかゆみ・痛みに オシリア 軟膏

ラナケイン[®]
LANACANE[®]

販売名: オシリア

外用痔疾用薬 第②類医薬品

特 徴

- きれ痔などによるかゆみ・はれ・痛みのための軟膏です
- ヒドロコルチゾン酢酸エステルがトラブルの原因である炎症を抑え、肛門のかゆみ・はれを鎮めます
- リドカインおよびジフェンヒドラミン塩酸塩が、肛門のしつこいかゆみを素早く抑えます
- べたつきの少ない使用感です

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

患部が化膿している人

2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦または妊娠していると思われる人

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、

直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和および消毒

用法・用量

適量をとり、肛門部に塗布する。なお、1日3回まで使用できる

<用法・用量に関する注意>

(1)定められた用法・用量を厳守すること

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること

(3)肛門部にのみ使用すること

成分・分量

100g中

成 分	分量	はたらき
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g	(抗炎症剤) 炎症をおさえ、かゆみ・はれ・出血をしめます
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	(抗ヒスタミン剤) かゆみの発生を抑えます
リドカイン	3.0g	(局所麻酔剤) 知覚神経を麻痺させ、痛み・かゆみを緩和します
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	(殺菌剤) 患部を殺菌し、細菌の感染を防ぎます
トコフェロール酢酸エステル	3.0g	(ビタミンE) 新陳代謝を高め、皮ふの生理機能を改善します

添加物として、ワセリン、ゲル化炭化水素、マイクロクリスタリンワックス、ベヘニルアルコール、サラシミツロウ、ラノリンアルコール、プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、BHT、ポリソルベート80、セスキオレイン酸ソルビタンを含有する

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品質がかわる)
- (4)火気に近づけないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元
 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)
 ☎ 0120-5884-01
 受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
 ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元
 小林製薬株式会社
 〒567-0057 大阪府茨木市豊川I-1-30-3