

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

エスタックゴールドA錠

第②類医薬品

総合かぜ薬 のどの痛み・発熱・鼻みすに ビタミンC配合

- エスタックゴールドA錠は、のどの痛み・発熱・鼻みすといったかぜの諸症状によく効く総合かぜ薬です。
- 解熱鎮痛成分・鎮咳去痰成分・抗ヒスタミン剤や消耗しがちなビタミン類などを配合していますから、かぜの諸症状を効果的に改善します。

⚠ 使用上の注意**☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)****① 次の人は服用しないでください**

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)

③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

④ 服用前後は飲酒しないでください**⑤ 長期連用しないでください****相談すること****① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。(4)高齢者。
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の症状のある人。高熱、排尿困難
(7)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 呼吸器 | 息切れ、息苦しさ |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 過度の体温低下 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死溶解症、急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腎障害 | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。 |

(裏面につづく)

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| ぜんそく | 息をするときゼーザー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |

③服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眼氣

④5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 カゼの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。

| 年 齢 | 成人(15才以上) | 11才～14才 | 5才～10才 | 5才未満 |
|-----|-----------|---------|--------|----------|
| 1回量 | 3錠 | 2錠 | 1錠 | ×服用しないこと |

〈用法・用量に関する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

| | | |
|------------|--------------------------------|-------|
| 成 分 | アセトアミノフェン…………… | 900mg |
| 9錠(成人1日量)中 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物…………… | 48mg |
| | dL-メチルエフェドリン塩酸塩…………… | 60mg |
| | クロルフェニラミンマレイン酸塩…………… | 7.5mg |
| | 無水カフェイン…………… | 75mg |
| | チアミン硝酸化物(ビタミンB1硝酸塩)…………… | 24mg |
| | リボフラビン(ビタミンB2)…………… | 12mg |
| | アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCカルシウム塩)…………… | 500mg |

添加物：カルメロースCa、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)瓶のフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5)瓶の中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

| | |
|---------|--|
| お問い合わせ先 | お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。 エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話 0120-028-193 受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く） |
|---------|--|

製造販売元
エスエス製薬株式会社
〒163-1488 東京都新宿区西新宿 3-20-2

発 売 元
オールジャパントラップ株式会社
東京都中央区日本橋本町 1-5-9