漢方薬成分の葛根湯と総合かぜ薬成分を

ひとつにしたかぜ薬

コフト®顆粒　12包入

4日分

第②類医薬品

かぜのひきはじめに効く漢方薬成分の

熱・のどの痛みせきに効く

葛根湯（かっこんとう）と総合（そうごう）かぜ薬（くすり）成分を

ひとつにしたかぜ薬

コフト®顆粒

ふたつのかぜ薬成分でかぜに効く



ビタミンC

12包入

4日分

第②類医薬品

成分　3包中

漢方薬葛根湯の生薬成分と作用　葛根湯エキス2,200mg中　カッコン…3.83g　マオウ…1.91g　タイソウ…1.91g　ケイヒ…1.43g　シャクヤク…1.43g　カンゾウ…0.96g　ショウキョウ…0.48g　7種類の生薬成分が、かぜのひきはじめに効果を発揮します

総合かぜ薬の成分と作用　アセトアミノフェン…450mg 熱を下げ、のどの痛み・頭痛を治します　クロルフェニラミンマレイン酸塩…7.5mg　鼻水・鼻づまり・くしゃみを抑えます　ジヒドロコデインリン酸塩…24mg せき中枢に働きせきを止めます　ビタミンC…500mg レモン25個分のビタミンCを含みます　ビタミンB_2…4mg 卵・牛乳に含まれる栄養成分です　グアイフェネシン…250mg たんを出しやすくします　無水カフェイン…90mg のどの痛み・頭痛を治す作用を高める効果があります

添加物　乳糖水和物・ヒドロキシプロピルセルロース・スクラロース・香料

保管及び取扱い上の注意（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい（2）小児の手の届かない所に保管して下さい（3）誤用の原因になったり品質が変わることがありますので、他の容器に入れ替えないで下さい（4）使用期限を過ぎた商品は服用しないで下さい

⚠**使用上の注意**　⊗**してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）1．次の人は服用しないで下さい（1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人（2）本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用して喘息を起こしたことがある人（3）12歳未満の小児　2．本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい　他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）　3．服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい（眠気等があらわれることがありますので）　4．授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけて下さい　5．服用前後は飲酒しないで下さい　6．長期連用しないで下さい

■**相談すること**　1．次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい（1）医師又は歯科医師の治療を受けている人（2）妊婦又は妊娠していると思われる人（3）高齢者（4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人（5）高熱、排尿困難の症状のある人（6）甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症の診断を受けた人

2．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

【右側面に続きが記載されています】

■**相談すること**の続き　まれに下記の重篤な症状が起こることがあります　その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮ふの広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮ふ上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりクラッとする、血尿等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる

3．服用後、便秘、口のかわき、眠気があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい　4．5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

1

第②類医薬品

開け口▼

コフト®顆粒

12包入

4日分

特長

1. かぜのひきはじめに効く漢方薬成分の葛根湯と熱・のどの痛み・せきに効く総合かぜ薬成分をひとつにした顆粒のかぜ薬です
2. 漢方薬の葛根湯と総合かぜ薬のふたつのかぜ薬成分の作用で、かぜに効きます
3. 配合の総合かぜ薬は頭痛・鼻水・鼻づまり・くしゃみ・関節の痛み等といった、かぜの諸症状に効きます
4. 12歳以上のお子様から大人まで服用できます
5. レモン25個分のビタミンC・ビタミンB_2配合

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

15歳以上の**成人1回1包**、12歳以上15歳未満1回2/3包、いずれも**1日3回**、食後なるべく30分以内に、水と一緒に服用して下さい　12歳未満は服用しないで下さい
残った顆粒を保管する場合、顆粒がこぼれ出ないようアルミ袋の開け口を3重に折り曲げ、2日以内に服用して下さい

用法及び用量に関連する注意　（1）用法・用量を厳守して下さい（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい

4 987174 721015

使用期限

製造番号

販売
日本臓器製薬
大阪市中央区平野町2丁目1番2号
お客様相談窓口　☎06・6222・0441
土・日・祝日を除く 9:00～17:00

製造販売元
新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269

副作用被害救済制度
0120・149・931
®登録商標

紙

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読み下さい
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい