

- 服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
- 使用期限(パッケージ側面およびビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと

高コレステロールを改善する
小林製薬の 医薬品
コレスチール[®]_a

血清高コレステロール改善薬

販売名:コレスチールa

第3類医薬品

特
徴

2つの働きのある有効成分「リポフラビン酪酸エステル」が、
血中の高コレステロールを改善します

1. コレステロールが余分に作られることを抑える
2. 余分な血中のコレステロールを体外へ排出する

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販
売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、 吐き気・嘔吐、胸やけ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の
持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師ま
たは登録販売者に相談すること
下痢
4. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文
書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

血清高コレステロールの改善

用法・用量 次の量を食後に水またはお湯で服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1カプセル	2回
15才未満	× 服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとしめること

成分・分量 1日量(2カプセル)中

成分	分量	はたらき
リポフラビン醜酸エステル	60mg	血中のコレステロールが余分に作られることを抑え、余分な血中のコレステロールを体外に排出する

添加物として、サラシミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、グリセリン、カラメル、酸化チタン、赤色102号を含有する

- リポフラビン醜酸エステルにより尿が黄色くなることがあります

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと
- (5) ピンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること
- (6) 乾燥剤は服用しないこと

 発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製造販売元
株式会社 ビオメディクス
〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14

製品のご質問
ご相談は **0120-63-9876**
午前9:00～午後5:00/土、日、祝日除く

オンラインショップ www2.kobayashi.co.jp

MADE IN JAPAN 10116781