

【この説明書は、本剤とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読みください。】

# ラカルト®メディカルケア

第3類医薬品

## 歯周病(歯肉炎・歯槽膿漏)薬

- ビタミンEが歯肉の血行を促進し、歯周病の症状改善をサポートします。
- グリチルレチン酸の抗炎症作用が、発赤・はれなどの症状をやわらげます。
- セチルピリジニウム塩化物水和物が歯周病や口臭の原因菌を殺菌し、症状の改善を助けます。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- ③ 5～6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 効能・効果

歯肉炎・歯槽膿漏にともなう諸症状(歯肉の発赤・はれ・うみ、口臭)の緩和

#### 用法・用量

適量(約0.3g、約1cm)を歯ブラシにつけて、1日2回(朝・晩)歯肉をマッサージするように磨いてください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 歯科用にのみ使用してください。

#### 成分

100g中

セチルピリジニウム塩化物水和物……………50mg  
グリチルレチン酸……………300mg  
トコフェロール酢酸エステル  
(ビタミンE酢酸エステル)……………2000mg

添加物：無水ケイ酸、D-ソルビトール、乳酸A $\beta$ 、ヒドロキシエチルセルロース、マクロゴール、メタケイ酸アルミン酸Mg、リン酸水素Ca、エドト酸Ca/2Na、パラベン、ウイキョウ油、サッカリンNa、ハッカ油、 $\beta$ -メントール、香料

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限をすぎたものは使用しないでください。

#### お問い合わせ先

お問い合わせ先、又はお客様相談室にお問い合わせください。  
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-028-193  
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元

エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

