

【この説明書は、本剤とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読みください。】

ラカルト[®]メディキュアー

第2類医薬品

歯槽膿漏・歯肉炎薬 クロルヘキシジン塩酸塩・ヒノキチオール配合

- 歯槽膿漏・歯肉炎の初期は、はっきりした自覚症状が少ないので、つい症状を悪化させてしまいがちです。いつまでも自分の歯でおいしく食事をとるためにも早めの手当てが大切です。
- ラカルトメディキュアーは、歯ぐきがゆるんではれたり、赤くなったりしているときに有効な歯槽膿漏・歯肉炎のための医薬品です。

《ラカルトメディキュアーの特長》

- 2つの殺菌成分**
クロルヘキシジン塩酸塩とヒノキチオールが、口中の細菌に対してすぐれた殺菌効果を発揮し、歯槽膿漏・口臭を原因から改善します。
- 症状を改善する消炎成分**
すぐれた消炎成分グリチルレチン酸が歯肉の赤味・はれ・ウミをともなう炎症状態を改善します。
- ビタミンEも配合**
血管を丈夫に保ち血行を促進し、歯肉組織の新陳代謝に深く係るビタミンEも配合しています。
- さわやかな使用感**
泡立ちをおさえたペパーミント風味で、口中がスッキリし、さわやかな使用感が得られます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

① 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

① 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。



② 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

③ 5～6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



効能・効果

歯槽膿漏・歯肉炎にともなう諸症状(歯肉の発赤・はれ・うみ、口臭)の緩和

用法・用量

本品0.2～0.5g(約1cm前後)を歯ブラシにつけて、1日2回(朝・晩)歯肉をマッサージするように磨いてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)歯科用にのみ使用してください。

成分

100g中

クロルヘキシジン塩酸塩…………… 100mg
 ヒノキチオール…………… 100mg
 グリチルレチン酸…………… 300mg
 トコフェロール酢酸エステル
 (ビタミンE酢酸エステル)…………… 2000mg

添加物：無水ケイ酸、D-ソルビトール、乳酸A ℓ 、ヒドロキシエチルセルロース、マクロゴール、メタケイ酸アルミン酸Mg、リン酸水素Ca、エドト酸Ca/2Na、パラベン、ウイキョウ油、サッカリンNa、ハッカ油、 ℓ -メントール、香料

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎたものは使用しないでください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先 お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193
 受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元

エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

