



**マッキンα**

**色がつかない  
消毒液** 外用/70mL  
指定医薬部外品

切り傷 すり傷 靴ずれに!

【成分】本品 70mL中  
クロルヘキシジングルコン酸塩液 (20w/v%) 0.175mL  
添加物 香料

【効能・効果】すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

【用法・用量】1日数回患部に噴霧又はガーゼ、脱脂綿等に浸して塗布

【用法に関する注意】(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (2)目に入らないように注意すること、万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと、なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (3)やけどのような痛みを伴う炎症をおこすことがあるので、溶液の状態では長時間皮膚と接触させないこと (4)外用にのみ使用すること

使用前にこの説明文書を必ず読むこと

【使用上の注意】

してほしくないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと (1)本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)患部が広範囲の人 (3)深い傷やひどいやけどの人 **相談すること** 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の診療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。皮膚：発疹・発赤、かゆみ まれに次の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。ショック(アナフィラキシー)：使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。3.5～6日間使用しても症状がよくなりません場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること (2)小児の手の届かない所に保管すること (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

(4)使用期限をすぎた製品は使用しないこと(使用期限は底面に記載)

製造販売元 玉川衛材(株) お客様相談窓口  
**玉川衛材株式会社** TEL.03-3861-2037  
東京都千代田区岩本町2-2-16 受付時間 10:00-17:00(土・日・祝日を除く)

4 901957 1035007

ポトル、ノズル  
キャップ、外観フィルム  
ラベル HA-O-K