

ご使用前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

便秘治療剤 イノプロA

イノプロAは正常な排便習慣の回復を助ける便秘治療剤です。
イノプロAは結腸・直腸粘膜の副交感神経末端に作用して蠕動運動を高め、また、腸粘膜への直接作用により排便反射を促す刺激性下剤であります。
イノプロAは腸溶性糖衣錠であり、胃で溶けずに腸で溶け、的確に効果をあらわします。
就寝時に服用すれば、翌朝に、また、空腹時に服用すれば、通常6～10時間位で作用をあらわします。
大腸運動の改善に伴い、本剤の服用間隔を徐々に延ばしてゆき、正常な排便習慣の回復にお役立てください。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬(下剤)
2. 大量に服用しないでください

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 次の症状のある人
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕

イノプロAは淡赤色の腸溶性糖衣錠で、次の成分を含んでいます。

1日最大服用量(3錠)中 ビサコジル……………15.0mg

添加物として、乳糖、セルロース、CMC-Ca、マクロゴール、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、グリセリン脂肪酸エステル、酸化チタン、アラビアゴム、ゼラチン、タルク、白糖、炭酸Ca、CMC-Na、カルナウバロウ、サラシミツロウ、赤色3号を含有しています。

〔効能・効果〕

○便秘

○便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔


〔用法・用量〕

下記の用量を1日1回就寝前又は空腹時かみくだかずに服用してください。

便秘の程度	成人(15才以上)	11才以上15才未満	11才未満
2～3日便通がないとき	1～2錠	1錠	服用しないこと。
4日以上便通がないとき	2～3錠	1～2錠	

ただし、便秘の程度、状態には個人差があるので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 服用前後1時間以内に牛乳又は制酸剤の服用を避けてください。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4) 錠剤の取り出し方（シートごと飲み込むと、のどに突き刺さるなど思わぬ事故につながる場合があります。



保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金（祝日を除く）
9：00～17：00

発売元

PI 株式会社プロダクト・イノベーション
富山県富山市浜黒崎239番地

製造販売元

オール薬品工業株式会社
兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地