

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

アルピタン[®] シリーズ トメラクト[®]

販売名: トメラクト

胃腸鎮痛鎮痙薬 第2類医薬品

特徴

- すぐに止めたいアルコールなどによる吐き気に効くお薬です
- 有効成分「オキセサゼイン」が胃の過剰な働きを抑えて吐き気を止めます
- 飲みやすい錠剤タイプです

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(2) 15才未満の小児
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬
3. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 高齢者
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛、ねむけ、めまい、脱力感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること：便秘
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

胃痛、腹痛、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、さしこみ(疝痛、癩)、胸やけ、胃酸過多、胃部不快感、げっぷ(おくび)

用法・用量

次の量の水又はお湯で服用し、服用間隔は4時間以上おいてください

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	2錠	1日3回まで
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
- (2)かまずにすぐに飲み込むこと(早く溶ける錠剤のため、成分が口中に広がると口内にしびれが残る)

成分・分量

1回量(2錠)中 オキセサゼイン5mg
添加物として、セルロース、リン酸水素Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、CMC、ケイ酸Al・ヒドロキシプロピルスターチ・セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

<錠剤の取り出し方>

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる)



製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
ホムページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先 (お客様相談室)
☎ **0120-5884-01**
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3