

押し開ける

第2類医薬品

販売名: 新生防風通聖散顆粒〈満量処方〉

【効能・効果】体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症: 高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

【用法・用量】次の量を1日3回朝夕、食前又は食間にそのまま水かお湯にて服用する成人(15歳以上)……1回1包 15歳未満……服用しないこと

<用法・用量に関連する注意> 用法・用量を厳守すること

※食間とは食事と食事の間を意味し、食後約2~3時間のことをいいます。

【成分・分量】1日量6.0g(2.0g×3包)中 防風通聖散料エキス4.5gを含有

トウキ……1.2g	ショウキョウ……0.3g	ジャクジュツ……2.0g
シャクヤク……1.2g	ケイガイ……1.2g	キキョウ……2.0g
センキュウ……1.2g	ハマボウフウ……1.2g	オウゴン……2.0g
サンシシ……1.2g	マオウ……1.2g	カンゾウ……2.0g
レンギョウ……1.2g	ダイオウ……1.5g	セッコウ……2.0g
ハッカ……1.2g	硫酸ナトリウム……1.5g	カッセキ……3.0g

添加物として、ヒプロメロース、ステアリン酸マグネシウム、D-マンニトールを含有する。本剤は天然物(生薬)のエキスをういた製品ですので、顆粒の色が多少異なることがあります。効能又は効果にはわかりありません。

【保管及び取扱い上の注意】1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。2.小児の手の届かない所に保管してください。3.使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

製造販売元

新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269

電話番号: 0744-52-3330

受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

【ご購入に関するお問い合わせ先】

アインズ&トルペ事務局

0120-50-1068(固定電話・PHSから)

0570-550-168(携帯電話から)

受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。他の瀉下薬(下剤) 2.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

■ 相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸が弱く下痢しやすい人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。下痢、便秘。
4.1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

副作用被害救済制度
電話: 0120-149-931

使用期限

製造番号

