

松浦の抑肝散ゼリー

本品はスティックタイプのゼリー剤です。水なしで服用いただけ、携帯に便利です。神経が高ぶり、怒りやすく、イライラなどがある方で、夜眠りにくいときに枕元に置いておけば即座に服用できます。



● 使用上の注意 ●



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 胃腸の弱い人
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
心不全	動くと息が苦しい、疲れやすい、足がむくむ、急に体重が増えた。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効能・効果 ●

体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：
神経症、不眠症、歯ぎしり、更年期障害、血の道症

〔効能・効果に関連する注意〕

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に口の中でゼリーをくずして服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	2回
15歳未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)開封後はすみやかに服用してください。
- (3)薬剤がのどにつかえることのないよう注意してください。
- (4)本品は1回分包、飲みきりですので、分割服用しないでください。
- (5)分包の開封時に内容物が飛び散らないよう注意してください。
- (6)切り取り部分で唇を切らないよう注意してください。

●成分・分量● 本剤2包(30g)中

抑肝散エキス	3.2g		
(トウキ	1.5g	ブクリョウ	2g
チョウトウコウ	1.5g	サイコ	1g
センキュウ	1.5g	カンゾウ	0.75g
ビャクジュツ	2g		

添加物として、アスパルテム（L-フェニルアラニン化合物）、カラギーナン、カンテン末、トレハロース水和物、キシリトール、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、香料、エタノール、グリセリンを含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL (052)883-5131 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発売元
松浦漢方株式会社
名古屋市昭和区円上町24-21

製造販売元
 **松浦薬業株式会社**
名古屋市緑区大高町寅新田36