

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面及び容器底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

Saiki さいき

治療ローション

外皮用薬

第2類医薬品

販売名: さいきa

製品特徴

1. つっぱり感、赤み、ヒリヒリなどを伴う、つらい乾燥荒れ肌の治療薬です
2. ヘパリン類似物質が、肌の奥底(*)の細胞から修復します
*基底層
3. 肌に浸透しやすいとろみローションタイプです

無香料 無着色 弱酸性 パラベンフリー アルコール(エタノール)フリー

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は使用しないこと

- (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病等)の人
- (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがある)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

乾皮症、小児の乾燥性皮膚、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、しもやけ(ただれを除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)

用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼ってください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 使用のつどキャップをしっかりとめること
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (3) 目に入らないように注意すること
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (4) 外用にのみ使用すること

成分・分量 100g中

成分	分量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3g	肌細胞を修復し、整えます 角質に潤いと柔軟性を与えます
グリチルリチン酸二カリウム	0.5g	肌の炎症を抑えます
アラントイン	0.2g	荒れたり、ひび割れた皮膚組織 の修復を助けます

添加物として、グリセリン、ジプロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、オリーブ油、スクワラン、dl-ピロリドンカルボン酸Na、安息香酸、水添大豆リン脂質、キサンタンガム、コレステロール、L-アスパラギン酸、グリシン、DL-アラニン、エドト酸Na、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、ベヘン酸、pH調節剤、その他1成分を含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

乾燥肌の治療用としては顔にもお使いいただけます

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)
0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN 10177199