

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

ビタミン含有保健薬

レバウルソゴールド 12錠

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人、(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	吐き気、下痢、胃部不快感

■効能 ●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

■用法・用量 成人(15才以上)1回3錠を、1日2回朝夕に服用します。

★15才未満は服用しないでください。

〈用法・用量に関する注意〉 (1) 定められた用法・用量を厳守してください。(2) 錠剤の取り出し方 右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



■成分・分量 6錠(1日量)中 肝臓水解物 600mg / ウルソデオキシコール酸 50mg / L-システイン 160mg / アスコルビン酸(ビタミンC) 300mg / ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン 30mg / リボフラビン(ビタミンB2) 12mg / ケイヒ末 100mg / ショウキョウ末 100mg 添加物として、無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、フマル酸、ステアリン酸、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、マクロゴール、三二酸化鉄、ケイ酸Ca、ウイキョウ油、カルナウバロウを含有します。

〈成分・分量に関する注意〉 (1) 本剤はビタミンB2を含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。(2) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。

◎保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるものがあります。)(4) 袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。(5) 品質を保持するため、開封後はお早めに服用してください。(6) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

発 売 元 佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

使用期限



製造販売元

富山県富山市草島15-1

製造記号



副作用救済制度

0120-149-931

製品のお問合せ先

03-5412-7393

第一薬品工業株式会社