

胃に

健胃 制酸

《顆粒》



第2類医薬品 **新** 中京和漢胃腸薬

食べすぎ・胸やけ
胃の不快感に **生薬配合**

ガジュツ配合



24包

 中京医薬品

和 **新** 中京和漢胃腸薬 第2類医薬品

0704

製造販売元 新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269

成分・分量

1日量(3包)中 1包1.2g

合成ヒドロタルサイト	700mg
炭酸水素ナトリウム	1200mg
ピオチアスターゼ	300mg
ガジュツ末	100mg
ケイヒ末	260mg
ロートエキス散	300mg
ウイキョウ末	35mg
チョウジ末	30mg
添加物として乳糖水和物、カンゾウ末、バレイショ デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメ ロースカルシウム、ℓ-メントール	
*矯味剤として「カンゾウ末」を100mg、芳香剤 として「ℓ-メントール」を10mg配合しています。	

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ(過飲)、胃痛、消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ(過食)、消化不良による胃部・腹部膨満感。

第2類医薬品

販売名:新中京和漢胃腸薬

押しあけて
ください。

ご使用に際しては、この
使用上の注意文書を必
ずお読み下さい。

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることある。)
4. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。排尿困難
(7) 次の診断を受けた人。腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
口の渇き、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

母乳が出にくくなることある。

〈用法及び用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 本剤は3才未満の乳幼児に服用させないこと。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の折り返しを折り返して保管し、3日以内に服用すること。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は、服用しないこと。

用法・用量

1日3回食後服用

大人15才以上	1回1包
11才以上15才未満	1回 $\frac{2}{3}$ 包
8才以上11才未満	1回 $\frac{1}{2}$ 包
5才以上8才未満	1回 $\frac{1}{3}$ 包
3才以上5才未満	1回 $\frac{1}{4}$ 包

〈お問い合わせ先〉

本剤についてのお問い合わせは下記までご連絡ください。

新生薬品工業株式会社
電話番号 0744-52-3330

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

24包入り(1包1.2g)

¥1,000+税

副作用被害救済制度 電話0120-149-931



世界の子供たちに健康と教育を
国際貢献活動を支援します
この商品の売り上げの一部は
「さすなASSIST基金」に寄付されます。

配置
期限

製造
番号

〈発売元〉



株式会社 中京医薬品

愛知県半田市亀崎北浦町2-15-1