

商品名

| 項目          | 内容  |      |     |          |              |
|-------------|---|------|-----|----------|--------------|
| 医薬品区分       | 一般用医薬品  |      |     |          |              |
| 薬効分類        | しもやけ・あかぎれ用薬   |      |     |          |              |
| 承認販売名       | アットノンL  |      |     |          |              |
| 製品名         | アットノンL  |      |     |          |              |
| 製品名(読み)     | アットノンエル   |      |     |          |              |
| 製品の特徴       | 1.ヘパリン類似物質の3つのはたらきにより傷あとを改善していきます。<br>2.伸びの良いローションタイプなので、広範囲の傷あとや、かきむしって残った傷あとにもおすすめてです。  |      |     |          |              |
| 使用上の注意      | <p>■してはいけないこと<br/>(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)</p> <p>1.次の人は使用しないこと<br/>出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人</p> <p>2.次の部位には使用しないこと<br/>目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)</p> <p>■相談すること</p> <p>1.次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること<br/>(1)医師の治療を受けている人<br/>(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人<br/>(3)湿潤やただれのひどい人</p> <p>2.使用後次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ、はれ</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.5～6日使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること</p> | 関係部位 | 症 状 | 皮膚       | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| 関係部位        | 症 状   |      |     |          |              |
| 皮膚          | 発疹・発赤、かゆみ、はれ  |      |     |          |              |
| 効能・効果       | きず・火傷のあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手指のあれ、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、打身・捻挫後のはれ・筋肉痛・関節痛   |      |     |          |              |
| 効能関連注意      |   |      |     |          |              |
| 用法・用量       | 1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼る   |      |     |          |              |
| 用法関連注意      | (1)使用のつどキャップをしっかりとしめること<br>(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること<br>(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること<br>(4)外用にのみ使用すること  |      |     |          |              |
| 成分分量        | 100g中 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ヘパリン類似物質</td> <td>0.3g</td> </tr> </tbody> </table>  | 成分   | 分量  | ヘパリン類似物質 | 0.3g         |
| 成分          | 分量  |      |     |          |              |
| ヘパリン類似物質    | 0.3g  |      |     |          |              |
| 添加物         | dl-ピロリドンカルボン酸Na、パラベン、エドト酸Na、BHT、セトステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、ジイソプロパノールアミン、香料、pH調節剤  |      |     |          |              |
| 保管及び取扱い上の注意 | (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること<br>(2)小児の手の届かない所に保管すること<br>(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)  |      |     |          |              |

|         |   |
|---------|---|
| 消費者相談窓口 | 発売元 <b>小林製薬株式会社</b><br>〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10<br><b>製品のお問合せ先 (お客様相談室)</b><br><b>0120-5884-01</b><br>9:00～17:00 (土・日・祝日を除く) |
| 製造販売会社  | 製造販売元 <b>小林製薬株式会社</b><br>〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3   |
| 販売会社    |   |
| 剤形      | 塗布剤   |
| リスク区分等  | 第2類医薬品  |