

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

COOLONE

鎮痛去痰薬

せき・たんに L-カルボシステイン配合

クールワン®せき止めGX液

第2類  
医薬品

クールワンせき止めGX液は、せきを鎮める成分中の約8割を修復する成分からの働きで、せき、たんの症状を効果的に改善します。

### ▲ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守るなどした状態の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本人は服用しないでください。  
本剤又はその成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。  
他の鎮痛去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含むもの、内服薬等(副作用  
内服薬、食物アレルギー、アレルギー用薬等)  
3. 服用後、嘔吐又は腹痛等の違和感を生じないでください。  
(嘔吐等があらわれることがあります。)4. 授乳中又は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。  
5. 過量服用・長期連用しないでください。

#### ■ 相関すること

1. 本人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 服用の受ける人 高齢、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	腹痛、吐き気、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、悪寒としびれ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (史蒂文ズ・ジョンソン症候群、 中毒性表皮剥離症候群)	発熱、目の充血、目のかすみ、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の発疹・発赤等が持続したり、急速に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻出血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなることとする、血球数があがる。
無顆粒球症	発熱、のどの痛み、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、そのような症状の発現又は増悪が疑われた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

・便血、口のかわき、尿血

4. 5〜6日服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

#### 効能

せき、たん

#### 用法・用量

下記の1回量を1日3回服用してください。なお、服用の際は、湯付の計量カップで量って服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	10mL	3回
11歳以上15歳未満	6.6mL	ただし、服用回数は4時間以上おいてください。
8歳以上11歳未満	5mL	
8歳未満		服用しないでください

#### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用する場合は、保護者の指導監督のもとに服用させていただきます。

#### 成分・分量

30mL中に次の成分が含まれています。(成人一日服用量)

成分名	分量	作用
L-カルボシステイン	750mg	のどにからんだ粘痰などを排出しやすい流動的な状態にするとともに、気道粘膜を正常化して、たんの排出を促します。
シクロジフェンヒタム塩酸塩	15mg	せき中枢に作用して、せきを止めます。
ホムチルエチアミン塩酸塩	37.5mg	気管支を拡張して、せきを止めます。
クロロフェニラミンプロピレジン塩酸塩	6mg	アレルギー性のせきに効果があります。

高濃度が、D-ソルビトール液、水酸化ナトリウム、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、アセチルアミノカリウム、スクラロース、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香ナトリウム、カラムール、香料、エタノール、プロピレングリコール、パリエリン、β-メトトル

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密閉して保管してください。
- (2) 小児の手が届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入替えしないでください。(服用の原状に間違い、品質が変わります。)
- (4) キップをゆるめる際、ビンの口をよく拭いてから、レシクをしめてください。
- (5) 計量カップは、使用がとどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。また、使用期限以内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。



- ★せき、たんを早く治すために、次の点にもご注意ください。
- 栄養・睡眠を十分にとり、体力の消耗を妨げず。
  - 室内の湿度の乾燥やホコリなどに気をつけましょう。
  - 喫煙は避けましょう。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
 ⑧0 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kouho/cgi/pmda/index.html>  
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買いかの店又は下記にお申し込み下さい。

森林製薬株式会社 <すり情報センター>  
 電話 0120-965-961

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日も稼働)