

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

第②類医薬品

せき、たんに

鎮咳去痰薬

# ビスティー<sup>®</sup>せき止め顆粒N

- ビスティーせき止め顆粒Nは、せきを鎮める成分（ジヒドロコデインリン酸塩、*dl*-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩）を1日最大分量配合し、せき、たんに優れた効果を発揮する鎮咳去痰剤です。
- 携帯に便利な分包タイプでヨーグルト風味の溶けやすく、のみやすい顆粒剤で、外出先での急なせき、たんにもしっかり対応できます。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
4. 過量服用・長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### <効能・効果>

せき、たん

### <用法・用量>

次の1回量を1日3回、食後に服用してください。

年 齢	1 回 量
成人 (15才以上)	1 包
11才以上15才未満	2 / 3 包
8 才以上11才未満	1 / 2 包
5 才以上 8 才未満	1 / 3 包
3 才以上 5 才未満	1 / 4 包
3 才未満	服用しないこと

### 用法・用量に関連する注意

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。
- (3)定められた用法・用量を厳守してください。

### <成分・分量>

本剤は、3包中に次の成分・分量を含んでいます。

※1包は1g入りです。

成 分	分 量	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢に作用して、せきを抑えます。
<i>dl</i> -メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を拡張して呼吸を楽にし、せきを抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	せきの原因物質の一つであるヒスタミンの作用を抑えて、アレルギーによるせきを抑えます。

添加物：粉糖、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、サッカリンNa、無水ケイ酸、香料、*l*-メントール、エタノール、エチルバニリン、トコフェロール、バニリン

### 保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の所にお問い合わせください。

大昭製薬株式会社 おくすり相談室

電話 0748-88-4181

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

発 売 元 京都薬品ヘルスケア株式会社  
京都市中京区西ノ京月輪町38番地

製造販売元 **大昭製薬株式会社**  
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168