

漢方濃縮煎剤当帰芍薬散^{とうきしゃくやくさん}23

本品は、お湯に溶かして服用する濃縮液体タイプの漢方製剤です。漢方薬本来の煎じ薬に近い服用感を手軽に再現できます。

「金匱要略」に記載されている処方で、虚弱で、冷え症や貧血、疲労しやすい人の下腹部痛、めまい、頭重、肩こりなどの症状が見られる人や、これらの症状のある女性の月経異常や更年期障害、妊婦の諸症状に広く用いられます。

1回分ずつの包装で外出先にも携帯できます。



● 使用上の注意 ●



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)胃腸の弱い人
- (3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効能・効果 ●

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

● 用法・用量 ●

次の量を食前又は食間に約20～100mLの水又は温湯を加え、よく攪拌して服用してください。（食間とは食後2～3時間を指します。）

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	2回
15歳未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)開封前によく振り、開封後はすみやかに服用してください。
- (3)分包の開封時に内容液が飛び散らないよう注意してください。

●成分・分量● 1日量2包(8.8g)中

当帰芍薬散抽出物	8.8g
(トウキ……………2g プクリョウ……………2.67g)	
(センキュウ……………2g ピャクジュツ……………2.67g)	
(シャクヤク……………2.67g タクシャ……………2.67g)	

添加物として、エタノールを含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なる場合がありますが、効果には変わりありません。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)携帯するときは、分包が折れ曲がらないようにしてください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)